



عنوان سند: دستورات بعد از عمل تمپانو

ماستوئیدکتومی

کد سند: NO-BK-۱۵۳



تهیه کننده:

دکتر علی اصغر عربی متخصص گوش حلق بینی

تنظیم کننده: فرحناز نریمسیا

سوپروایزر آموزش سلامت

۸- اگر سرگیجه ندارید میتوانید رانندگی کنید و محدودیتی برای پرواز هوایی وجود ندارد .

۹- بعد از عمل جراحی ممکن است به دلیل وجود پانسمان شنوایی گوش عمل شده ضعیف تر شده باشد . شنوایی شما بعد از جراحی با توجه به گسترش بیماری و نوع عمل انجام شده متفاوت خواهد بود .

۱۰- در صورت وجود این علائم حتما پزشک خود را مطلع کنید . تب ، سرگیجه دورانی که تهوع یا استفراغ درد یا ترشح مداوم .

۱۱- در برخی موارد بخیه ها قابل جذب می باشد و احتیاج به کشیدن ندارد و در سایر موارد بسته به نوع جراحی روز هفتم ماستوئیدکتومی ساده تا روز ۱۵ ماستوئیدکتومی رادیکال کشیده میشود .

منابع: کامینگز

۱- پانسمان گوش باید بین روز سوم تا هفتم تعویض شود .

۲- یک هفته بعد از جراحی پانسمان برداشته میشود و پس از برداشتن پانسمان می توانید با صلاحدید پزشک استحمام کنید .

۳- حداقل یک ماه در هنگام استحمام کردن حتماً از پنبه و وازلین استفاده کنید .

۴- ممکن است بعد از برداشتن پانسمان مختصری ترشحات خونابه ای از گوش داشته باشید که طبیعی است .

۵- به مدت یک ماه از فین کردن و باد انداختن در گوش خودداری کنید و با دهان باز عطسه یا سرفه کنید .

۶- تا یک هفته از فعالیت شدید بپرهیزید .

۷- در صورتی که درد داشتید میتوانید از داروهای مسکن مثل استامینوفن استفاده کنید .