



مرکز آموزشی درمانی شفا

عنوان سند: مراقبت های بعد از تزریق داخل چشمی

کد سند: NO-BK-۲۲۰



تهیه کننده: مرضیه پور سعید

تنظیم کننده: فرحناز نریمسیا

سوپروایزر آموزش سلامت

منابع: کتاب چشم پزشکی عمومی تالیف دکتر

محمدعلی جوادی، ویراست دوم، بهار ۱۳۹۷

سنگین و خم شدن پرهیزید.

علائم زیر اهمیت کمی داشته و دلیل مراجعه به پزشک نیست:

۱- احساس درد یا تحریک مختصر در قسمت تزریق
که معمولاً چند ساعت تا یک یا دو روز طول می کشد.

۲- قرمزی یا تورم در محل تزریق که معمولاً در قسمت
خارجی چشم است.

۳- دیدن نقاط و با سایه های متحرک بدنبال تزریق
که معمولاً ناشی از ذرات هوا یا خونریزی مختصر است
و معمولاً چند ساعت تا یک یا دو روز طول می کشد.

۴- ممکن است بیمار در ساعات اول بعد از تزریق
دیدش به خوبی قبل از تزریق نباشد که این مسئله
گذراست.

عوارض و علائم مهم بدنبال تزریقات داخل چشمی :

۱- درد شدید

۲- کاهش دید پیش رونده

۳- تورم شدید پلک ها

۴- قرمزی شدید و پیش رونده

در صورت بروز هر کدام از علائم بالا سریعاً به چشم
پزشک خود و یا اگر در دسترس نیست به چشم
پزشک دیگر مراجعه کنید.

۱- اگر چشم شما در روز تزریق ملتهب و یا عفونی است
قبل از تزریق به پزشک خود اطلاع دهید.

۲- از به کار بردن وسایل آرایشی در اطراف چشم در
روز تزریق و تا چند روز بعد از آن خودداری کنید.

۳- در صورت داشتن هر نوع حساسیت دارویی به
پزشک خود اطلاع دهید.

۴- بعد از تزریق معمولاً چشم پانسمان می شود و این
پانسمان به مدت حداقل ۳ ساعت روی چشم می ماند.

۵- بعد از برداشتن پانسمان قطره های تجویز شده را
در چشم بریزید معمولاً قطره کلرامفنیکل یا
سیپروفلوکساسین هر ۶ ساعت تا ۳ روز تجویز می
شود.

۶- از وارد کردن اب به چشم و شنا به مدت چند روز
خودداری کنید شستن سر و صورت و استحمام به
شرطی که اب وارد چشم نشود بعد از ۲۴ ساعت مجاز
است.

۷- ممکن است تا چند ساعت به دنبال تزریق دید
مناسب نداشته باشید به همین دلیل تا برگشت دید
مناسب از انجام کارهای دقیق بینایی مثل رانندگی و
کارهایی که ماهیت پرخطر دارند پرهیزید.

۸- بهتر است که روز اول بعد از تزریق در جای تمیز
باشید و از دود-گردوخاک-باد و بخار اب دوری کنید.

۹- از ورزش و فعالیت شدید بدنی بلند کردن اجسام