



مرکز آموزشی درمانی شفا

عنوان سند: مراقبت های بعد از عمل جراحی آب مروارید و لنز

کد سند: NO-BK-۲۲۲



تهیه کننده:

سمیه مسجدی

تنظیم کننده: فرحناز نریمپسا

سوپروایزر آموزش سلامت

قطره ها را طبق دستور زیر استفاده نمایید:

* قطره سیپروفلوکساسین هر ۶ ساعت یک قطره تا
یک ماه و سپس قطع شود.

* قطره بتامتازون هر ۴ ساعت یک قطره تا یک ماه

منابع: پرستاری داخلی-جراحی برونر و سوارث
۲۰۱۸

لطفا بعد از عمل جراحی آب مروارید و لنز نکات زیر را رعایت فرمایید

۱- روز بعد از عمل جهت معاینه مراجعه نمایید.

۲- روز سوم پس از عمل استحمام کنید.

۳- محافظ پلاستیکی را تا یک هفته استفاده کنید.

۴- تماشای تلویزیون و فعالیت های عادی روزانه
منعی ندارد.

۵- رژیم غذایی نیاز نمی باشد مگر در مواردی
بیماری خاص داشته باشند.

۶- داروهای قبلی (قند- فشارخون- قلبی و) را
طبق روال قبل مصرف نمایید.

۷- در صورت درد چشم- کاهش بینایی- قرمزی
شدید و ترشح چرکی اورژانسی مراجعه کنید.

۸- هنگام چکاندن قطره نوک قطره چکان با مژه ها
یا پوست پلک تماس پیدا نکند.

۹- در زمان خواب نیاز به ریختن قطره نمی باشد.