



مرکز آموزشی درمانی شفا

عنوان سند: آشنایی با آسیب قرنیه - زخم قرنیه - عفونت قرنیه (کراتیت)

کد سند: NO-BK-۲۲۴



تهیه کننده:

مرضیه پورسعید

تنظیم کننده: فرحناز نریمیا

سوپروایزر آموزش سلامت



در انتها ، شفای عاجل را برای همه بیماران از
خداوند منان خواستاریم.

منابع: کتاب چشم پزشکی عمومی تألیف دکتر محمدعلی
جوادی، ویراست دوم، بهار ۱۳۹۷

۳- استامینوفن برای درد خفیف چشم

۴- در مواردی که عفونت قرنیه شدید باشد با
استفاده از آنتی بیوتیک های تزریقی قطره های
فورت (غلیظ شده) تهیه و به بیمار داده می شود.

گر چیزی در چشمانم رفت چه کار کنم:
* ابتدا سعی کنید بخش بیرونی چشم را با اب تمیز
شویید.

* پلک زدن یا کشیدن پلک بالایی بر روی پلک
پایینی ممکن است سبب خارج شدن ذرات از زیر
پلک شود.

* از مالیدن چشمانتان خودداری کنید.

* سعی نکنید چیزی را مستقیماً از روی قرنیه
بردارید. این کار ممکن است باعث آسیب شدیدتر
شود.

* چنانچه نتوانستید ذره را بردارید به پزشک
مراجعه کنید.

علائم شایع :

۱- درد چشم که معمولاً شدید است

۲- حساسیت به نور زیاد

۳- انقباضات ناگهانی و شدید در پلک

۴- سوزش و خارش چشم

۵- ترشح از چشم

۶- قرمزی در ناحیه سفیدی چشم

علل زخم قرنیه :

استفاده از لنزهای تماسی چشم به مدت طولانی -
قرار نگرفتن لنز تماسی در جای خود- آسیب
قرنیه در اثر پریدن یک جسم خارجی مثل تراشه
چوب یا فلز شن گرد و خاک یا شیشه به درون
چشم - عفونت پلک و ملتحمه (پوشش ناحیه
سفیدی چشم) بسته نشدن کامل پلک ها -
عفونت چشم با ویروس تبخال- مالیدن شدید
چشم ها - خراش قرنیه بوسیله ناخن شاخه
درخت و

ویرایش: دوم تاریخ: ۱۴۰۰/۱/۲۰ صفحه: ۲ از ۶

تمامی عفونت های چشمی مسری هستند و از
یک فرد به فرد دیگر یا از یک قسمت از بدن
به قسمت دیگر انتقال می یابند.

پیشگیری :

۱- دستان خود را مرتب بشویید.

۲- از وارد آمدن آسیب به قرنیه خود جلوگیری
کنید.

۳- هنگام تراشکاری و کار با فلز و چوب عینک
های مخصوص محافظت از چشم استفاده کنید.

۴- اگر تبخال دارید دست به چشمان خود نزنید.

۵- در استفاده از لنزهای تماسی دقت شود.

۶- شاخه های اویزان درختان را ببرید.

۷- ناخن نوزاد و یا کودک کم سنتان را کوتاه کنید
گاهی ضربه ها می تواند پارگی کره چشم را ایجاد.

نکرده بلکه سبب خونریزی داخل چشم شود.

ویرایش: دوم تاریخ: ۱۴۰۰/۱/۲۰ صفحه: ۳ از ۶

۷- آسیب شبکیه

۸- آسیب عصب بینایی و آب مروارید شود که
باید جدی گرفته شود و سریع تحت درمان و عمل
جراحی قرار گرفته شود.

عوارض :

در صورت غفلت از زخم قرنیه تخریب بافتی می
تواند در قرنیه نفوذ کرده و باعث ورود عفونت به
داخل کره چشم شود و در این صورت ممکن است
بینایی فرد به طور دائم از دست برود.

داروهای لازم برای زخم قرنیه :

۱- قطره های آنتی بیوتیک چشمی یا آنتی

بیوتیک های تزریقی برای عفونت باکتریایی

۲- دارو برای عفونت های ویروسی یا قارچی

ویرایش: دوم تاریخ: ۱۴۰۰/۱/۲۰ صفحه: ۴ از ۶