



مرکز آموزشی درمانی شفا

## عنوان سند: اندوکاردیت یا التهاب درون شامه قلبی

کد سند: NO-BK-۲۴۲



تهیه کننده:

مژگان باقری

تنظیم کننده: فرحناز نریمپسا

سوپروایزر آموزش سلامت

چک صداهای قلبی، کنترل علائم MJ (سکته قلبی) کنترل علائم CUA (سکته مغزی) بررسی تمام مسیرهای تهاجمی، محدودیت فعالیت (فعالیت ها باید به صورتی باشند که بین آنها دوره های استراحت در نظر گرفته شده باشد) کلیه مسیرهای تهاجمی و زخم ها باید روزانه از نظر قرمزی، حساسیت به لمس، گرمی، تورم، ترشح مورد بررسی قرار گیرند.

منابع: پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث ۲۰۱۸

به مصرف آنتی بیوتیک ها میکند معمولا یک هفته یا بیشتر در بیمارستان می گذارند (هنگامی که تب و در بدترین علائم از بین رفت بیمار میتواند بیمارستان را ترک کند و مصرف آنتی بیوتیک را به مراجعه به مطب دکتر خود و با مراقبت در منزل ادامه دهد و به طور منظم با پزشک خود مشورت کند تا درمان خوب پیش رود)

### ۱. عمل جراحی:

اگر عفونت به دریچه های قلبی آسیب برساند ممکن است علائم و عوارض سال ها بعد از درمان وجود داشته باشد گاهی اوقات جراحی برای درمان عفونت های مکرر یا جایگزین دریچه آسیب دیده مورد نیاز است همچنین جراحی برای درمان اندوکاردیت که ناشی از عفونت های قارچی است ضروری می باشد. با توجه به وضعیت بیمار، پزشک ممکن است توصیه کند دریچه آسیب دیده خود را تعمیر کنید یا آن را با دریچه مصنوعی ساخته شده از گاو، خوک یا بافت قلب انسانی (بافت بیولوژیکی) با مواد مصنوعی (دریچه مکانیکی) تعویض کنید.

### تدابیر پرستاری:

آموزش پیشگیری از عفونت: بهداشت دست، کنترل تب، دریافت مایعات کافی (برای حفظ شفافیت رنگ ادرار)

**اندوکاردیت:** یک عفونت غشا درونی است که داخل اتاق و دریچه های قلب به وجود می آید.

### علائم:

علائم و نشانه های اندوکاردیت در افراد متفاوت است درد خستگی ، تب و لرز ، تورم پاها و شکم، کبودی بدن (پشتی ) تاکی کاردی ( افزایش ضربان قلب) ، تنگی نفس فعالیتی ، آمبولی شریان ها مغزی( علاوم CNS) تخریب دریچه های قلب ، سوفل قلبی (سرو صدای قلب، جدید یا تغییر یافته است) درد مفاصل و ماهیچه ها، درد قفسه سینه هنگام نفس کشیدن ، کاهش وزن نامعلوم، التهاب در طحال ، ضایعات جین وی (لکه های قرمزروی کف پایا و یا کف دستها هستند) خود در ادرار (ممکن است به چشم دیده شود و یا در زیر میکروسکوپ مشاهده شود).

### عامل ابتلا به اندوکاردیت:

اندوکاردیت معمولا هنگامی اتفاق می افتد که باکتری ها و قارچ ها وسایر میکرو ارگانیسم ها از قسمت دیگری از بدن در جریان خون پخش می شوندو به قسمت های آسیب دیده قلب متصل می شوند اگر به سرعت درمان

نشود می تواند به علائم و نشانه های اندوکاردیت در افراد متفاوت است درد خستگی ، تب و لرز ، تورم پاها و شکم، کبودی بدن (پشتی ) تاکی کاردی ( افزایش ضربان قلب) ، تنگی نفس فعالیتی ، آمبولی شریان ها مغزی( علاوم CNS) تخریب دریچه های قلب ، سوفل قلبی (سرو صدای قلب، جدید یا تغییر یافته است) درد مفاصل و ماهیچه ها، درد قفسه سینه هنگام نفس کشیدن ، کاهش وزن نامعلوم، التهاب در طحال ، ضایعات **جین وی** (لکه های قرمزروی کف پایا و یا کف دستها هستند) خود در ادرار (ممکن است به چشم دیده شود و یا در زیر میکروسکوپ مشاهده شود).

### عامل ابتلا به اندوکاردیت:

۱. اندوکاردیت معمولا هنگامی اتفاق می افتد که باکتری ها و قارچ ها وسایر میکرو ارگانیسم ها از قسمت دیگری از بدن در جریان خون پخش می شوند و به قسمت های آسیب دیده قلب متصل میشوند اگر به سرعت درمان نشود می تواند به هایی که به درستی درمان نمیشوند.

۲. توجه ویژه ای به سلامت دندان های خود داشته باشید و به طور منظم دندان ها و لثه ها را مسواک بزنید و به طور منظم چک کنید.

۳. اجتناب از روش هایی مانند سوراخ کردن بدن یا خالکوبی که ممکن است باعث عفونت های پوستی شود.

### تشخیص:

۱. آزمایش خون : کشت خون  
۲. اکوکاردیوگرام  
۳. تصاویر اشعه ایکس: به پزشک کمک میکند تا وضعیت ریه ها و قلب را ببیند و اینکه آیا سبب افزایش قلب میشود یا اینکه عفونت به ریه ها گسترش یافته است (TEE) (اکو از طریق مری) ممکن است اطلاعات بهتری نسبت به تصویر برداری از طریق توراکس (قفسه سینه) فراهم نماید).

۴. پرتو نگاری مایکروویو یا تصویر برداری تشدید مغناطیسی : ممکن است پزشک از بیمار یک سیتی اسکن یا اسکن مغناطیسی مغز قفسه سینه یا سایر قسمت های بدن بگیرد تا اطلاع پیداکنند این بیماری درچه منطقه ای گسترش پیدا کرده است.

### درمان:

۱. **استفاده از آنتی بیوتیکها:**  
پزشک ممکن است برای مبارزه با عفونت بهترین گزینه آنتی بیوتیک ها را انتخاب کند هنگامی که بیمار شروع