



## عنوان سند: عفونت مجرای اشکی

کد سند:

NO-BK-۲۷۸



تهیه کننده:

سمیه مسجدی

تنظیم کننده: فرحناز نریمیا

سوپروایزر آموزش سلامت

مخاط و چرک به جای آب از مجرای اشکی

### درمان:

پزشک شما براساس بررسی علائم بیماری درمان  
هایی را به شما پیشنهاد می کندگاهی این درمان  
به سادگی کمپرس آب گرم و مصرف آنتی  
بیوتیک است ولی اغلب اوقات جراحی درمان  
موثرتری است.

در طول درمان عفونت فعالیت را کاهش دهید- از  
شنا کردن و ورزش های تماسی خودداری کنید -  
رژیم غذایی خاصی ندارد.

### چه چیزهایی باعث عفونت یا انسداد مجرای اشکی می شوند :

انسداد مجرای اشکی ممکن است ناشی از موارد  
زیر باشد: اختلال ارثی- عفونت باکتریایی مجرا -  
عفونت سینوس یا بینی به ویژه عفونت مزمن  
بینی و پولیپ های بینی - آسیب چشم - عفونت

چشم از جمله قرمزی شدید چشم ( کونژکتیویت)

شکستگی بینی یا استخوان های صورت

منابع: پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث ۲۰۱۸

## داکروسیستیت(عفونت مجرای اشکی):

-عفونت مجرای اشکی بین چشم و بینی -  
کیسه یا غده اشکی داکروسیستیت نام دارد.  
-میکروب های عامل عفونت می تواند به  
سایر افراد منتقل شوند این عفونت در تمام  
سنین رخ می دهد اما در کودکان شایع تر  
است.

-اگر مجرای اشکی بسته شده باشد اشک را  
پس می زند و مانند زمانی که گریه می کنید  
از لبه پلک و گوشه های چشم بیرون می ریزد  
اشکی که داخل کیسه محبوس شده است هم  
دچار عفونت می شود گاهی به علت افزایش  
سن یا عفونت های مکررمجرای اشکی این  
مسیر عبور اشک تنگ تر شده و منجر به  
انسداد آن می شود که عمل این مشکل  
انسدادی را رفع می کند.

### علائم بیماری:

اشک ریزش همیشگی یک یا هر دو چشم -  
درد قرمزی تورم زیر چشم که عفونت را مطرح  
می کند - قرمزی و تورم مجرای اشکی - تخلیه