



مرکز آموزشی درمانی شفا

عنوان سند: مصرف داروهای روماتولوژی

کد سند: NO-BK-۲۹۰



تهیه کننده:

سارا سالاری

فاطمه زینلی

تنظیم کننده: فرحناز نریمپسا

سوپروایزر آموزش سلامت

✓ اگر برای اصلاح فسفر استفاده شود باید

در وسط غذا میل شود.

منابع: کتاب داخلی و جراحی

پرستاری، برونروسودارث ۲۰۱۸

کتاب اطلاعات دارویی

مراقبت ها:

✓ دارو را میتوان همراه غذا یا با معده خالی میل کرد.

✓ دارو را در ظرف مقاوم به نور و جای خشک

نگهداری کنید.

✓ در صورت بروز علائم ذکر شده به پزشک اطلاع

دهید.

✓ از شکستن و خرد کردن یا جویدن دارو خودداری

کنید.

✓ دارو را همزمان با داروهای مثل: سایمتیدین،

رانیتیدین داروهای ضد تشنج با توجه به نظر پزشک

مصرف کنید.

داروی کربنات کلسیم:

برای پایین آوردن فسفر و کمک به افزایش کلسیم

استفاده می شود.

عوارض: یبوست، تهوع، استفراغ، خشکی دهان، دل

درد، تشنگی

مراقبت ها:

✓ این دارو اگر برای اصلاح کلسیم استفاده می شود

حتما باید با معده خالی مصرف شود (یک ساعت قبل یا دو

ساعت بعد از غذا)

مقدمه:

اهمیت و مصرف صحیح شایع ترین داروهای مصرفی را در زیر مطالعه نمایید و جهت اطلاعات بیشتر با پزشک و پرستار معالج خود مشورت نمایید.

داروی اریتروپویتین (پرکس):

اریتروپویتین پروتئینی است که در کلیه ها برای تحریک استخوان برای ساختن گلبول های قرمز تولید می شود که به وسیله این دارو کم خونی جبران و خستگی کمتر می شود.

روش استفاده: به صورت وریدی و زیر جلدی

عوارض: افزایش فشار خون، افزایش بروز لخته

مراقبت ها:

✓ از تکان دادن شدید دارو حتی هنگامی که در جعبه است خودداری کنید.

✓ در یخچال نگهداری شود.

✓ در مجاورت نور و گرما قرار ندهید. از گرم کردن دارو با

مالش شدید در میان دست خودداری کنید.

✓ نیم ساعت قبل از مصرف در دمای اتاق باشد.

✓ قبل از تزریق دارو فشار خون خود را چک کنید)

فشار سیستولی شما باید کمتر از ۱۶۰ باشد.

ویرایش: دوم تاریخ: ۱۴۰۰/۱/۲۰ صفحه: ۲ از ۶

در صورت وجود یکی از موارد زیر دارو را استفاده نکنید :

✓ کدر یا رنگی شدن یا تیره شدن دارو

✓ مشاهده ذرات معلق در دارو

✓ خاموش شدن یخچال در اثر قطع برق یا خرابی

✓ یخ زدن دارو بر اثر سرمای شدید یخچال

✓ گذشتن تاریخ انقضاء

داروی ونوفر (آهن):

برای درمان کم خونی استفاده می شود .

روش استفاده: به صورت وریدی توسط پرستار در بخش

دیالیز استفاده می شود.

عوارض: افت فشار خون، تهوع، استفراغ، احساس طعم

فلز در دهان، درد قفسه سینه

مراقبت ها :

✓ در صورت بروز عوارض حتما اطلاع دهید.

✓ نیاز به نگهداری در یخچال ندارد.

✓ حتما در مراکز درمانی تزریق شود.

ویرایش: دوم تاریخ: ۱۴۰۰/۱/۲۰ صفحه: ۳ از ۶

داروی رنائل:

کمک به پایین آوردن سطح فسفر خون

عوارض:

سردرد، تهوع، استفراغ، کاهش فشار خون

مراقبت ها:

✓ رعایت رژیم غذایی کم فسفر

✓ این دارو با داروهای ضد تشنج و برخی داروهای

تداخل دارد که حتما باید پزشک خود را از مصرف

داروهای قبلی خود مطلع سازید.

✓ دارو را همراه غذا میل کنید.

✓ قرص ها به طور کامل بلعیده شود آن را نصف نکنید

و نجوید.

داروی روکاترول یا کلسیتریول :

در درمان کمبود سطح کلسیم خون و افزایش فعالیت

پاراتیروئید استفاده می شود.

عوارض:

بی اشتهایی، تهوع و استفراغ، اسهال، کاهش وزن، تعریق،

سردرد، تشنگی، سرگیجه و افزایش غلظت کلسیم و

فسفات در پلاسما

ویرایش: دوم تاریخ: ۱۴۰۰/۱/۲۰ صفحه: ۴ از ۶