



مرکز آموزشی درمانی شفا

عنوان سند:

انجام سی تی اسکن باتزریق وسی تی
آنژیوگرافی

کد سند: NO-BK-۲۹۹



تهیه کننده:

شهین مرادی نصب

تنظیم کننده: فرحناز نریمپسا

سوپروایزر آموزش سلامت

مثال:

در صورتیکه سی تی اسکن قرار است صبح شنبه
ساعت ۸/۵ انجام شود.

قرص اول ساعت ۷ / ۵ جمعه شب میل گردد.

قرص دوم ساعت ۱ / ۵ نیمه شب میل گردد.

قرص سوم ساعت ۷ / ۵ صبح شنبه میل گردد.

منابع: اطلس مریل

مراقبت بعد از سی تی تزریقی یا سی تی آنژیوگرافی

بیمار تا نیم ساعت بعد از تزریق از خوردن و
آشامیدن خودداری کند.

- بعد از نیم ساعت در صورتی که مشکلی (از نظر
سرگیجه و) ...نبود ، آنژیوکت بیمار در آورده شده و
بیمار میتواند از بخش خارج شود و خوردن و
آشامیدن بلامانع است.

- در صورت امکان تا ۶ ساعت مایعات فراوان میل
شود.

قابل توجه بیمارانی که سابقه حساسیت دارند:

در صورت تجویز قرص پردنیزولون پزشک رادیولوژی
نحوه مصرف سه عدد قرص به صورت ذیل می باشد:

۱- ۱۳ ساعت قبل از انجام

۲- ۷ ساعت قبل از انجام

۳- ۱ ساعت قبل از انجام

این محتوای آموزشی برای ارتقا آگاهی شما در مورد آمادگی لازم قبل از سی تی یا رادیوگرافی تزریقی و مراقبت بعد از آن می باشد.

آمادگی های لازم جهت انجام سی تی اسکن با تزریق و سی تی آنژیوگرافی:

از نظر حساسیت (غذایی، دارویی، نیش زنبور، گل و گیاه، گرد و خاک و) ... و آسم به پزشک سی تی اسکن حتما اطلاع داده شود.

در صورت داشتن سابقه حساسیت پزشک رادیولوژی داروهای کاهش دهنده واکنش آلرژیک را تجویز مینماید این داروها از ۱۳ ساعت قبل از تزریق باید مصرف شود.

عکس العمل های بدن به ماه کنتراست و خطرهای آلرژیک جدی، بسیار نادر است. لذا احتمال واکنش آلرژیک برای شما کم است پس آرامش خود را حفظ کنید.

بخش تصویر برداری به داروها و وسایل مورد نیاز از نظر

میباشد و به این موارد سریعاً "رسیدگی خواهد شد. هیچگونه نگرانی در صورت بروز واکنش های آلرژیک نداشته باشید.

بخش تصویر برداری به داروها و وسایل مورد نیاز از نظر انجام اقدامات اورژانسی هنگام بروز واکنش های آلرژیک مجهز می باشد و به این موارد سریعاً "رسیدگی خواهد شد. هیچگونه نگرانی در صورت بروز واکنش های آلرژیک نداشته باشید.

هرگونه بیماری و سابقه قبلی به پزشک سی تی اطلاع داده شود.

در صورت مصرف متفورمین، ۴۸ ساعت قبل و ۴۸ ساعت بعد از انجام سی تی مصرف قرص قطع شود.

بیمارانی که مشکل کلیوی دارند بعد از تأیید پزشک رادیولوژی باید هیدراته شوند) آب فراوان بنوشند یا سرم دریافت نمایند.

در صورت ابتلا به بیماری مسری، نظیر هیپاتیت، سل، ایدز و بیماریهای عفونی حتماً پزشک و کارشناس را در جریان بگذارید.

پوشیدن لباس ساده و آزاد بدون دکمه، زیپ و هر نوع تزئینات از جمله پولک، گلدوزی، منجق و... مناسب است. در صورت داشتن سی تی از ناحیه سر و جمجمه، در آوردن تمامی اشیاء فلزی نظیر گوشواره، کلیپس، گیره الزامی است.

در روز انجام آزمایش:

ناشتا بودن ۸ ساعت قبل از تزریق

به همراه داشتن نتیجه آزمایش اوره و کراتینین)

از آخرین آزمایش بیشتر از ۱۰ (روز گذشته باشد)

توجه: در صورت طبیعی نبودن آزمایش اوره

و کراتینین بعد از تأیید پزشک رادیولوژی نیاز به

مشاوره با یک نفرولوژیست است.

به همراه داشتن یک همراه، در غیر این صورت از

انجام سی تی معذوریم.

داروی تزریقی (ماده حاجب) از طریق انژیوکت و

معمولاً از ناحیه دست تزریق می شود.