



مرکز آموزشی درمانی شفا

عنوان سند:

پریکاردیت؛ التهاب پرده قلب

کد سند: NO-BK-۳۱۲



تهیه کننده:

حدیث نادری

تنظیم کننده: فرحناز نریمیسا

سوپروایزر آموزش سلامت

پزشک ممکن است از پریکاردیوسنتز برای تخلیه مایع اضافی استفاده کند (با استفاده از سوزن یا یک عمل جراحی کوچک)

بررسی مایع تخلیه شده به تعیین علت تامپوناد قلبی کمک میکند

عوارض پریکاردیت

عوارض پریکاردیت نادر می باشند، ولی عفونت ممکن است باعث اختلال ریتم یا حتی بلوک قلبی شود

(وقتیکه ایمپاس های الکتریکی مولد ریتم قلبی بخوبی انتقال نمی یابند)

پریکاردیت کنستریکتیو (فشارنده) نیز ممکن

است رخ دهد که در این حالت التهاب باعث می شود که پریکارد ضخیم شده و باعث اسکار (بافت

ترمیمی چسبنده) مابین پریکارد و قلب گسترش یابد پریکارد انعطاف خود را از دست میدهد و

نارسایی قلبی بوجود می آید

هم چنین ممکن است **آریتمی** و **نارسایی قلبی** نیز رخ دهند

عکس برداری با استفاده از اشعه ایکس ممکن است تجمعی از مایع را در اطراف قلب نشان دهد این تصویر را می توان بوسیله الگوی قلبی تایید کرد (اکو کاردیوگرافی)

ممکن است **نوار قلب** تغییراتی مبنی بر بروز پریکاردیت را نشان دهد

گاهی انجام پریکاردیوسنتز (روشی که در آن نمونه مایع از پریکارد برداشته شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد) برای کمک به تشخیص علت پریکاردیت ضروری است

درمان پریکاردیت

در صورتی که علت بیماری عفونت باکتریایی باشد معمولاً **آنتی بیوتیک** تجویز میشود برای کاهش درد و التهاب داروهای مسکن و ضد التهابی مانند **آسپرین** یا **بروفن** داده می شود

با این حال، اگر این حالت منجر به تجمع مایع در اطراف قلب شود، به گونه ای که قابلیت پر شدن قلب از خون محدود شود (یک اختلال نادر ولی کشنده معروف به تامپوناد قلبی)

منابع: کتاب اطلاعات داروئی رویکرد جدید

کتاب گیوم

پریکاردیت

پریکاردیت عارضه ای است که در آن پریکاردیوم یعنی غشایی که دور قلب را می پوشاند دچار التهاب میشود این التهاب باعث بروز درد در قفسه سینه میشود

پریکارد یا آبشامه دو لایه دارد: لایه داخلی به دیواره عضلانی قلب چسبیده است و لایه خارجی حفره قفسه ی سینه که قلب در آن قرار گرفته است را میپوشاند. بین این دو لایه مایع لغزنده ای وجود دارد که قلب را در عین ثابت بودن در جای خود، قادر به تپیدن میکند وقتی که پریکاردیت باعث التهاب این غشا میشود حرکت قلب در عمل محدود میشود بویژه توانایی قلب برای پر و خالی شدن از خون کاهش می یابد

علائم پریکاردیت

شایع ترین علامت پریکاردیت یک درد تیز و شدید خنجر مانند، در مرکز یا سمت چپ قفسه سینه (نزدیک قلب) می باشد که گاهی اوقات این درد به سمت گردن یا شانه نیز انتشار می یابد

این درد ممکن است به آسانی با علایم یک حمله قلبی اشتباه گرفته شود
وقتی این فرد خوابیده است و یا در زمان نفس کشیدن عمیق، درد معمولاً بیشتر خواهد بود
عرق کردن و خستگی نیز از علائم دیگر این بیماران قلبی می باشند.

علل پریکاردیت

یکی از شایعه ترین علتهای پریکاردیت بویژه در جوانان عفونت های ویروسی است. در بسیاری از موارد دلایل پریکاردیت ممکن است ناشناخته باقی بمانند

دلایل دیگر پریکاردیت شامل حمله قلبی، سرطان، پرتودرمانی، آسیب به قفسه سینه، جراحی قلبی قفسه سینه، بیماری خود ایمنی ، نارسایی کلیه یا استفاده از داروهای سرکوب کننده ی سیستم ایمنی می باشند.

تشخیص پریکاردیت

پزشک با گوش دادن به صحبت های شما درباره توصیف درد و نحوه شروع آن، پریکاردیت را تشخیص میدهد همچنین پزشک با گوش دادن بوسیله گوشی پزشکی به صداهای قلبی، این عارضه را تشخیص میدهد.

صداهای ناشی از پریکاردیت مثل صدای ناشی از مالش دو سطح چرم می باشد که در قفسه سینه به خوبی شنیده میشوند.

صداهای ناشی از پریکاردیت در هر ضربان قلب، با مالش لایه های ملتهب پریکارد بر روی یکدیگر ایجاد می شوند.

