



مرکز آموزشی درمانی شفا

عنوان سند:

داروی زالربان (ریواروکسابان)

کد سند: ۳۱۳-NO-BK



تهیه کننده: حدیث نادری

تنظیم کننده: فرحناز نریمینا

سوپروایزر آموزش سلامت

ممکن است قرصهای ۱۰ میلی گرم همراه با یا بدون غذا مصرف شود. قرصهای ۱۵ میلی گرم باید همراه با غذا مصرف شوند
- اگر نمی توانید دارو را ببلعید قرص را خرد کنید و همراه با آب سیب بخورید
- دارو را منظم مصرف کنید تا بهترین اثر درمانی را داشته باشد
- مقدار و طول درمان شما بر پایه ی شرایط پزشکی و پاسخ شما به درمان میباشد

هشدارها

در صورت داشتن حساسیت به زالربان به پزشک خود اطلاع دهید مخصوصا اگه دچار بیماری کبدی - کلیوی و مشکلات خونریزی دهنده (مانند کم خونی - هموفیلی - ترومبوسیتوپنی) و مشکلات خاص چشمی هستید.

عوارض جانبی

کبودی - خونریزی خفیف - در صورت مشاهده علائم خونریزی شدید از قبیل درد - ورم غیر طبیعی احساس خارش - خونریزی طولانی از لثه - بینی - سردرد شدید - سرگیجه - احساس ضعف و خستگی به پزشک خود اطلاع دهید

منابع: کتاب اطلاعات داروئی رویکرد جدید

کتاب گیوم

قرص زالربان (xalerban)

کاربرد

زالربان یک داروی ضد انعقادی است که در برخی موارد جایگزین وارفارین میشود که با تجویز پزشک استفاده میشود
- در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی
- افراد مبتلا به لخته ی وریدهای عمقی
- آمبولی ریوی

دوز داروها

زالربان بصورت قرصهای ۲۰-۱۵-۱۰ میلی گرم یافت میشود

نحوه مصرف

میزان مصرف این دارو توسط پزشک تعیین میشود اگر این دارو را برای درمان لخته خون استفاده میکنید مقدار مصرفی روزی دوبار در سه هفته اول و بعد از آن روزی یکبار مصرف می شود این دارو را بیشتر از مقدار تجویز شده مصرف نکنید و بدون توصیه پزشک، خودتان دارو را قطع نکنید.

آپیکسابان (Apixaban)

داروی آپیکسابان جهت پیشگیری از بروز سکتة مغزی یا لخته های خونی در افرادی تجویز میشود که به فیبریلاسیون دهلیزی مبتلا بوده و عامل آن بیماری دریچه قلب نیست

فیبریلاسیون دهلیزی بیماری است که در آن تپش قلب نامنظم بوده و احتمال تشکیل لخته و بروز سکتة قلبی افزایش می یابد. این دارو با مهار کردن یک ماده طبیعی موثر در تشکیل لخته خونی تاثیر خود را بر جا می گذارد

علاوه بر موارد فوق آپیکسابان جهت درمان ترومبوزورید عمقی (DVT) و آمبولی ریوی نیز بکار گرفته میشود

نحوه مصرف

آپیکسابان بصورت قرصهای خوراکی، تولید و معمولاً دو وعده در روز با معده پر یا خالی مصرف می شود. این دارو پس از جراحی به ترتیب به مدت ۳۵ و ۱۲ روز مصرف میشود این دارو باید روزانه در ساعت مشخصی مصرف شود

این دارو باید دقیقاً به گونه تجویز شده و طبق دستور پزشک مصرف شود.

افراد نباید دفعات یا مقدار مصرف دارو را تغییر دهند در صورت عدم توانایی در بلع قرص ها می توان آنها را خرد و در آب یا آبلیمو حل کرد. این ترکیب باید بلافاصله پس از تهیه مصرف شود

حتی در صورت احساس سلامتی باید به مصرف آپیکسابان ادامه داد. افراد باید از قطع مصرف این دارو بدون مشورت با پزشک خودداری کنند

هشدارها

در صورت داشتن حساسیت به آپیکسابان یا دیگر داروها به پزشک خود اطلاع دهید همچنین در صورت مصرف هر کدام از داروهای زیر حتماً به پزشک اطلاع دهید.

۱- کاربامازپین ۲- کلاریترومایسین ۳- ایتراکونازول
۴- کتوکونازول ۵- فنسی ۶- ریفامپین

۷- داروهای مهارکننده ی بازجذب

سروتونین (SSRI) مثل سیتالوپرام-فلوکسیتین -

فلووکسامین -سرتالین

بسیاری از داروهای دیگر نیز می توانند با آپیکسابان تداخل داشته باشند بهمین علت باید تمامی داروهای مصرفی خود را به پزشک اطلاع داد

در صورت فراموشی یک وعده به محض یادآوری آنرا مصرف کرد در صورتیکه تقریباً زمان مصرف وعده بعدی فرا رسیده باشد باید از مصرف وعده فراموش شده صرف نظر کرد

عوارض جانبی آپیکسابان

* در صورت داشتن هریک از علائم فوق فوراً با پزشک خود تماس بگیرید
* خونریزی از لثه

* خونریزی بینی

* ادرار قهوه ای - قرمز یا صورتی

* مدفوع قیری-سیاه رنگ

* تورم و درد مفاصل

* سردرد - کهیر

* تنگی نفس