

کربنات کلسیم :

کپسول ۵۰۰ میلی گرمی

موارد مصرف: پوکی و نرمی استخوان _ کاهش اسید معده و سوزش سردل

عوارض: یبوست، سنگ کلیه، تورم صورت، تشنگی، تکرر ادرار، افزایش فشار خون

آموزش به بیمار: دارو را ترجیحا بعد از غذا و همراه با آب فراوان مصرف کنید.

سبوس گندم و حبوبات ممکن است جذب کلسیم را کاهش دهند.

در افراد مبتلا به سنگ کلیه ناشی از کلسیم مصرف مکمل ویتامین ث توصیه نمیشود (۱).

کارودیلول:

قرص ۶.۲۵ و ۱۲.۵ و ۲۵ میلی گرمی

موارد مصرف: کاهش فشار خون

عوارض: سرگیجه، کاهش فشار خون وضعیتی، کاهش ضربان قلب

آموزش به بیمار: جهت جلوگیری از کاهش فشار خون وضعیتی به آرامی بنشینید و بایستید.

در هنگام مصرف این دارو از مصرف داروهای ضدبارداری خوراکی خودداری شود، مگر با دستور پزشک (۱).

بی کربنات سدیم:

موارد مصرف: خنثی شدن اسید معده

عوارض: گیجی، سردرد، تهوع، استفراغ، بی اشتهایی، سنگ های ادراری

آموزش به بیمار: از مصرف همزمان با آنتی اسیدهای حاوی کلسیم جلوگیری شود.

همراه با یک لیوان آب مصرف شود.

با شیر مصرف نشود (۲).

هپارین:

آمپول ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰ واحدی

موارد مصرف: ضدانعقاد خون

عوارض: کاهش پلاکت، درد خفیف و خارش در محل تزریق، خون در ادرار و مدفوع، استفراغ خونی، مشکل در دید

آموزش به بیمار: از مصرف همزمان با ایبوپروفن و آسپرین خودداری شود. دارو را در زمان های مشخص استفاده کنید.

آزمون های انعقادی خون اعم از (PT_PTT_INR_CBC) به طور منظم انجام شود.

از مسواک نرم و به آرامی استفاده کنید.

از تزریق عضلانی خودداری شود.

در زمان تزریق به صورت زیرجلدی نیاز به آسپیراسیون نمیباشد (۳).

بیزوپرولول:

قرص ۲.۵ و ۵ و ۱۰ میلی گرمی

موارد مصرف: داروی کاهنده فشار خون

عوارض: سرگیجه، خواب آلودگی، تهوع، سبکی سر، کرخت شدن اندامها، احساس سرما در نوک انگشتان، افزایش سطح آنزیم های کبدی.

آموزش به بیمار: از مصرف همزمان این دارو با الکل و فراورده های الکلی به دلیل کاهش فشار خون وضعیتی و سنکوپ جلوگیری شود.

همراه با مایعات فراوان مصرف شود. از بلند شدن ناگهانی جلوگیری شود.

هنگام مصرف این دارو در بیماران دیابتی، قندخون به طور مرتب چک شود.

به دلیل خنثی شدن علائم پرکاری تیروئید همزمان با مصرف این دارو، تست های تیروئیدی به صورت دوره ای چک شود.

در صورت فراموشی مصرف یک نوبت دارو به محض یادآوری استفاده گردد.

در صورتی که یک روز کامل مصرف دارو فراموش شود نیاز به مصرف مجدد یا دوبرابر کردن دوز آن نمیباشد و طبق روال قبل مصرف شود.

از مصرف همزمان با گیاهان کاهنده فشارخون جلوگیری شود (۲).

نیتروگلیسرین:

قرص ۲.۶ و ۶.۴ میلی گرمی

موارد مصرف: کاهش درد قفسه سینه در افراد مبتلا به بیماری های قلبی، کاهش فشارخون

عوارض: گرگرفتگی، سردرد، ضعف، تاری دید

آموزش به بیمار: به آرامی نشسته و بایستید.

در مدت ۱۵ دقیقه نباید بیش از یک قرص مصرف کرد.

از شکستن و له کردن دارو بپرهیزید (۲).

آمیودارون:

قرص ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرمی

موارد مصرف: در آریتمی های قلبی کاربرد دارد

عوارض: واکنش های پوستی، آسیب عصبی، دل درد، تهوع و استفراغ، کاهش یا افزایش فشارخون، افزایش وزن، ادرار تیره، افزایش حساسیت به نور، دیدن هاله های سبز و آبی اطراف اشیاء.

آموزش به بیمار: از قرار گرفتن در آفتاب بپرهیزید و در صورت مجبور شدن از کرم ضد آفتاب به صورت مرتب استفاده شود. معاینات مرتب چشم پزشکی انجام شود.

از آب گریپ فروت استفاده نشود زیرا باعث افزایش میزان دارو میشود.

در افرادی که به ید حساسیت دارند مصرف نشود (۲).

والپرات سدیم:

قرص ۵۰۰ میلی گرمی

موارد مصرف: سردرد میگرنی، صرع، تشنج

عوارض: اختلالات گوارشی، بثورات پوستی، مشکلات بینایی، سوت کشیدن گوش، مشکلات حافظه

آموزش به بیمار: دارو همزمان با غذا مصرف شود_ تست های کبدی به صورت منظم انجام گردد.

قبل از شروع دارو شمارش پلاکت انجام گردد.

استفاده همزمان با زینک و فولیک اسید جهت جلوگیری از کم خونی (۲).

سولفات منیزیم:

موارد مصرف: داروی ضد تشنج

عوارض: کاهش ضربان قلب و فشارخون، اسهال، خواب آلودگی، تعریق، کاهش دمای بدن

آموزش به بیمار: با آب فراوان مصرف شود.

دو ساعت قبل از غذا مصرف شده و قبل از استفاده از سوسپانسیونها آن را تکان دهید (2).

پتاسیم:

موارد مصرف: کمبود پتاسیم

عوارض: ضعف، سردرد، بلوک قلبی، اسهال

آموزش به بیمار: با یک لیوان پراز آب مصرف شود. از مصرف آن تی اسیدهای جانشین نمک و مسکن ها به طور همزمان با این

دارو خودداری شود، مگر با دستور پزشک (2).

آمیلودیپین:

قرص ۲.۵ و ۵ میلی گرمی

موارد مصرف: کاهش فشار خون

عوارض: سرگیجه، سردرد، کاهش فشارخون وضعیتی

آموزش به بیمار: با احتیاط نشسته و بایستید. بهتر است با معده‌ی خالی مصرف شود (4).

لوزارتان:

قرص ۲۵ و ۵۰ میلی گرمی

موارد مصرف: کاهش فشار خون، جهت محافظت از کلیه در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ تجویز میشود

عوارض: سرگیجه، سبکی سر

آموزش به بیمار: مصرف همزمان بامو، پرتقال و گریپ فروت، اسفناج و کلم بروکلی ممنوع است.

مصرف همزمان با هپارین، آسپرین، وارفارین و دیکلوفناک ممنوع است (۴).

پنتوپرازول:

قرص ۴۰ میلی گرمی

موارد مصرف: کاهش اسید معده

عوارض: سردرد، درد قفسه سینه، عفونت مجاری ادراری، درد شکمی

آموزش به بیمار: از مصرف همزمان با آمپی سیلین، نمکهای آهن و کتوکونازول جلوگیری شود زیرا باعث کاهش جذب دارو میشود.

در افراد دیابتی قند خون مرتب چک شود زیرا باعث افت فشار خون میشود.

در طی درمان از شیردهی بپرهیزید.

بهتر است دارو را قبل از غذا مصرف کنید (۲).

انوکساپارین:

موارد مصرف: ضد انعقاد خون

عوارض: ادم، تهوع، درد، خونریزی

آموزش به بیمار: از مسواک نرم و با احتیاط مصرف شود.

با استفاده از کیسه یخ میتوان کبودی محل تزریق را برطرف کرد (۲).

فنی توئین

کپسول ۵۰-۱۰۰ میلی گرم، سوسپانسیون

موارد مصرف: ضد تشنج

عوارض: تهوع، استفراغ، خشکی دهان، یبوست، تورم لثه، از دست رفتن تعادل،

آموزش به بیمار: برای کاهش عوارض گوارشی فنی توئین آن را با غذا مصرف کنید.

بهداشت دهان و دندان را رعایت کنید. از مسواک نرم و با احتیاط مصرف شود.

تغییر رنگ ادرار (قرمز یا قهوه ای) اهمیت چندانی ندارد.

فنی توئین اثر برخی داروهای ضدبارداری را کاهش می دهد. بنابراین بهتر است از روش های دیگر پیشگیری از بارداری بهره گیرید.

کنترل قند خون در بیماران دیابتی توصیه شود.

به طور دقیق دندانها را با مسواک نرم شستشو دهید و از نخ دندان به منظور جلوگیری از هایپر پلازی لثه استفاده کنید (۲).

فورزماید

قرص ۴۰ میلی گرم

موارد مصرف: کاهنده فشارخون، ادرارآور

عوارض: تهوع، خشکی دهان، سرگیجه، تاری دید، سردرد

آموزش به بیمار: به منظور پیشگیری از تداخل دارو با خواب، دارو صبح ها مصرف شود.

لازم است از رژیم غذایی پر پتاسیم (اسفناج، پوجه فرنگی، موز، پرتقال و ...) تبعیت کنید.

میزان مایعات را ۲-۳ لیتر در روز (در صورت عدم منع مصرف) افزایش دهید.

کنترل قند خون در بیماران دیابتی توصیه شود.

به منظور کاهش خطر افت فشار خون، به آهستگی از وضعیت خوابیده و نشسته تغییر وضعیت دهید.

به منظور کاهش نشانه های گوارشی، دارو را با غذا یا شیر مصرف کنید.

جهت پیشگیری از حساسیت به نور آفتاب، از البسه محافظ و ضد آفتاب استفاده کنید (۲).

ریواروکسابان چیست؟

ریواروکسابان یک داروی ضد انعقاد است که با پیشگیری از تشکیل لخته خون، از بروز انسداد عروق و عوارض ناشی از آن

جلوگیری می نماید.

لخته های خون می توانند در سیاهرگ های ناحیه پا، ریه، مغز یا قلب تشکیل گردند و باعث جلوگیری از خون رسانی مناسب به این نواحی شوند.

نحوه صحیح مصرف ریواروکسابان

ریواروکسابان را دقیقاً طبق تجویز پزشک، به صورت منظم در روز مصرف نمایید. چنانچه شما تحت درمان جهت برطرف شدن لخته ی خون تشکیل شده باشید.

در صورتی که مقدار مصرف ریواروکسابان ۱۰ میلی گرم یا کمتر باشد، می توانید آن را قبل یا پس از غذا مصرف نمایید. - چنانچه در یک نوبت بیشتر از ۱۵ میلی گرم برای شما تجویز گردیده است، می توانید آن را همراه یا پس از غذا مصرف کنید. زیرا مصرف این دارو همراه غذا جذب آن را از طریق معده افزایش می دهد.

سعی کنید دارو را به صورت منظم و در زمان مشخصی از روز مصرف نمایید. این کار از فراموش کردن مصرف دارو جلوگیری می نماید.

چنانچه در بلعیدن قرص ها مشکل دارید، میتوانید قرص را خرد کرده و یا در یک لیوان آب یا پوره ی سیب حل نمایید و سپس میل کنید.

در صورت فراموشی یک نوبت مصرف ریواروکسابان، به محض یادآوری، دارو را مصرف نمایید. مگر اینکه نوبت بعدی فرا رسیده باشد. در این صورت نوبت فراموش شده را مصرف ننموده و نوبت های بعدی را طبق روال سابق مصرف نمایید. از دو برابر نمودن مقدار مصرف در یک نوبت خودداری کنید

توصیه ها

در مدت درمان با این دارو تحت نظر پزشک خود بمانید تا وضعیت بهبودی شما به صورت منظم و دوره ای بررسی گردد و - در صورت نیاز آزمایشات بالینی مورد نظر. درخواست شود.

در صورتی که جراحی لگن یا زانو داشته اید، پس از چند هفته ممکن است پزشک مصرف دارو را قطع نماید. چنانچه دارو - برای سایر موارد تجویز شده باشد، مصرف آن ممکن است دوره ی طولانی تری برای شما تجویز گردد.

در صورت خرید هر گونه مکمل و دارو (حتی بدون نسخه) حتماً با پزشک خود در مورد مصرف ریواروکسابان صحبت کنید. - زیرا مصرف برخی داروها می تواند با داروی ریواروکسابان تداخل ایجاد نمایند

در صورتی که نیاز به جراحی دندان دارید، حتماً درمانگر خود را در جریان مصرف این دارو قرار دهید-

عوارض ناخواسته دارویی ریواروکسابان

در صورت مشاهده ی هرگونه علائم خونریزی (استفراغ خونی، وجود خون در ادرار، مدفوع یا خلط، خونریزی لثه، خونریزی -



غیر طبیعی واژینال، کبودی و کوفتگی بی دلیل و...) حتماً به پزشک مراجعه نمایید

چنانچه احساس تهوع، سوءهاضمه و درد معده نمودید، از مصرف غذاهای پر چرب و پر ادویه خودداری نمایید و حتماً دارو را - پس از غذا مصرف کنید

در صورت احساس سرگیجه، خستگی یا از حال رفتن، از رانندگی و کار با ابزاری که نیاز به تمرکز دارند خودداری نمایید-

آزمایشات خون دوره ای که برای شما تجویز می گردد، جهت بررسی تغییرات فاکتورهای انعقادی خون در روند درمان لازم - است. در صورت مشاهده ی تغییرات غیر طبیعی در این آزمایشات، افزایش درجه حرارت بدن (تب)، ورم ناحیه ی پا یا مچ، بروز لکه های قرمز پوستی و خارش، حتماً با پزشک خود صحبت نمایید

در صورت تجربه ی هرگونه خونریزی بدون علت مشخص، حتماً به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه نمایید -.

عوارض جانبی ریواروکسابان

پوستی: ترشح زخم، خارش، تاول زدن پوست

گوارشی: درد شکمی، خونریزی گوارشی

هماتولوژی و آنکولوژی: خونریزی شدید

کبدی: افزایش سطح سرمی آنزیم های ترانس آمیناز

سیستم عصبی: سرگیجه، بی خوابی، اضطراب، افسردگی، خستگی، سنکوپ

عصبی، عضلانی و اسکلتی: کمردرد، درد دست و پا، اسپاسم عضلانی

تنفسی: برونشکتازی، خونریزی ریوی (۵)

معرفی داروی آپیکسابان

داروی الیکویس (Eliquis)، که با نام عمومی آپیکسابان (Apixaban) نیز شناخته می شود

، مانع از فعالیت برخی از مواد (Apixaban)، که با نام عمومی آپیکسابان (Eliquis) داروی الیکویس

لخته کننده ی خون در بدن می شود.

این دارو همچنین بعد از جراحی تعویض مفصل یا زانو، برای جلوگیری از ایجاد نوعی لخته‌ی خونی – تحت عنوان که می‌تواند باعث ایجاد لخته در ریه‌ها نیز بشود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مصرف داروی – (DVT) ترومبوز وریدی عمیق الیکویس، خطر ایجاد مجدد این لخته‌ها را نیز کاهش می‌دهد
مصرف داروی الیکویس یا آپیکسابان را بدون مجوز دکتر، قطع نکنید. زیرا قطع مصرف ناگهانی این دارو می‌تواند موجب افزایش خطر ایجاد لخته‌ی خون یا سکتته‌ی مغزی شود

نکات مهمی که قبل از مصرف آپیکسابان باید رعایت کرد

اگر نسبت به آپیکسابان حساسیت دارید، دارای دریچه‌ی قلب مصنوعی هستید، یا هرگونه خونریزی فعال در اثر عمل جراحی، جراحی یا دلایل دیگر دارید، نباید از داروی الیکویس استفاده کنید

داروی الیکویس یا آپیکسابان می‌تواند باعث شود که شما به راحتی دچار خونریزی شوید. مخصوصاً اگر دچار یک اختلال خونریزی موروثی و یا ناشی از بیماری باشید

برای اطمینان از اینکه مصرف داروی الیکویس برای شما خطری را در پی ندارد، اگر موارد زیر را دارید، به دکتر

اطلاع دهید

بیماری کلیوی (یا اگر تحت انجام دیالیز هستید)؛

بیماری کبدی؛

اگر بیشتر از ۸۰ سال دارید؛

اگر وزن شما کمتر از ۶۰ کیلوگرم است؛

یادآوری می‌شود که مصرف داروی الیکویس می‌تواند باعث ایجاد لخته‌ی خونی خیلی خطرناک در اطراف نخاع و ستون فقرات شما شود. مخصوصاً اگر شرایط خاصی را در مورد نخاع و ستون فقراتتان داشته باشید. این نوع از لخته‌ی خونی

می‌تواند منجر به فلج طولانی مدت یا دائمی در شما شود و احتمال رخدادن آن در موارد زیر بیشتر است

اگر تا به حال سابقه‌ی جراحی ستون فقرات داشته‌اید؛

اگر اخیراً یک بیهوشی اپیدورال داشته‌اید؛

، (Aleve) ، ناپروکسن (Advil, Motrin) از داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی استفاده می کنید - مانند: ایبوپروفن، دیکلوفناک، ایندومتاسین، ملوکسیکام و غیره؛
در حال استفاده از داروهای ضد انعقاد خون دیگری هستید؛
سایر مشکلات مربوط به نخاع یا ستون فقرات دارید

نحوه مصرف

از مصرف دوز بیشتر یا کمتر از مقداری که برای شما تجویز شده است، خودداری کنید و فقط در همان دوره ی زمانی که برای شما تجویز شده، آن را مصرف کنید

می توانید داروی الیکویبیس یا آپیکسابان را به همراه غذا یا بدون آن، مصرف نمائید

داده شود. یک قرص را خرد کنید و آن را در سرنگی که حاوی (NG) این دارو ممکن است به همراه لوله ی تغذیه ۶۰ میلی لیتر دکستروز ۵٪ درون آب است، مخلوط کنید. سپس مخلوط مورد نظر را بلافاصله درون لوله ی تغذیه بگذارید. آن را برای استفاده در زمان های دیگر، نگهداری نکنید. این مخلوط را با دهان نخورید

الیکویبیس از منعقد شدن خون و ایجاد لخته های ناخواسته، جلوگیری می کند. بنابراین می تواند باعث شود شما به سادگی دچار خونریزی، حتی در اثر افتادن به زمین و یا ضربه ی خفیف به سر، شوید. در صورتی که به زمین افتادید یا دچار آسیب در سر شدید و یا خونریزی داشتید که بند نمی آمد، به دکتر مراجعه کرده و یا از فوریت های پزشکی کمک بگیرید

اگر قرار است یک عمل جراحی داشته باشید و یا نوبت دندانپزشکی دارید، در صورتی که در ۲۴ ساعت گذشته داروی الیکویبیس را استفاده کرده اید، به دکتر یا دندانپزشک خودتان، از قبل خبر دهید. ممکن است لازم باشد تا مصرف این دارو را برای یک مدت کوتاه قبل از جراحی و یا سایر فرآیندهای پزشکی، قطع کنید

مصرف داروی آپیکسابان را بدون اجازه ی دکترتان قطع نکنید. قطع مصرف این دارو به طور ناگهانی، ممکن است باعث افزایش خطر لخته شدن خون یا سکته ی مغزی شود

اگر به هر دلیلی، مصرف این دارو را قطع کردید، تا قبل از اینکه مجدداً داروی الیکوییس را مصرف کنید، ممکن است دکتر به شما داروی ضد انعقاد خون دیگری را تجویز کند.

برای اینکه نتیجه‌ی بهتری از مصرف این دارو بگیرید، آن را به صورت منظم مصرف نمایید. همچنین قبل از اینکه دارویتان تمام شود، مجدداً آن را به میزانی که دکتر تجویز کرده، تهیه کنید.

دارو را در دمای اتاق نگهداری کرده و دور از گرما و رطوبت قرار ده

اگر یک بار مصرف این دارو را فراموش کردید، به محض اینکه به یاد آوردید، آن را مصرف کنید. قرص بعدی را هم در زمان مقرر خودش استفاده کنید و زمانش را تغییر ندهید. همچنین دارو را همچنان به میزان دو بار در روز مصرف کنید و برای جبران دوز مصرفی از دست رفته، داروی اضافه و بیشتری مصرف نکنید.

چنانچه بیشتر از میزان مورد نیاز، این دارو را مصرف کردید، به موارد اورژانسی در مورد مصرف زیاد این دارو مراجعه کنید و یا از پزشک کمک بگیرید

از چه مواردی در دوره مصرف داروی آپیکسابان یا الیکوییس باید خودداری کرد؟

از فعالیت‌هایی که باعث افزایش خطر خونریزی یا جراحی در شما می‌شود، خودداری کنید. همچنین در هنگام اصلاح صورت و یا مسواک زدن، بیشتر مراقبت کنید.

گریپفورت و آب گریپفورت، ممکن است با داروی آپیکسابان تداخل داشته باشد و منجر به عوارض جانبی ناخواسته‌ای در فرد شود

نکاتی که باید مورد توجه قرار دهید

اگر هر گونه علائم آلرژیکی نسبت به این دارو - شامل کهیر، به دشواری نفس کشیدن، التهاب صورت، لب‌ها، زبان یا گلو - در خود مشاهده کردید، حتماً به دکتر اطلاع دهید

همچنین اگر علائم مربوط به لخته شدن خون در اطراف ستون فقرات را دارید (مانند: درد در پشت، بی‌حسی یا ضعف عضلات در نیمه‌ی پایینی بدن، از دست دادن کنترل مثانه یا روده)، از فوریت‌های پزشکی کمک بگیرید

اگر موارد زیر را دارید، بلافاصله به دکتر اطلاع دهید به راحتی بهبود شدن، خونریزی غیر طبیعی (از دهان، بینی، واژن یا مقعد)، خونریزی از زخم و جراحی و یا تزریق سوزنی، هر گونه خونریزی که بند نیاید؛

خونریزی شدید در دوران قاعدگی؛

سردرد، گیجی، ضعف، احساس اینکه هر لحظه ممکن است بیفتید؛

ادراری که به نظر قرمز، صورتی یا قهوه‌ای می‌رسد؛

مدفوع سیاه یا خونی، با سرفه خون بالا آوردن، استفراغی که شبیه دانه‌های قهوه باشد؛

البته لازم است ذکر شود که ممکن است موارد دیگری نیز در صورت استفاده از این دارو رخ دهد. چنانچه موارد دیگری را مشاهده نمودید، به دکتر مراجعه کنید

تأثیر داروهای دیگر بر آپیکسابان – تداخل‌های دارویی

بسیاری از دارو ها ممکن است با آپیکسابان تداخل داشته باشند. تعداد کمی از این دارو ها در زیر آورده شده است. چنانچه شما از داروی دیگری استفاده می‌کنید، حتماً قبل از مصرف آپیکسابان، با دکتر خود مشورت کنید. هر دارویی که مصرف می‌کنید یا قصد شروع یا قطع مصرف آن در دوره مصرف داروی آپیکسابان یا الیکویبیس را دارید، با دکتر در میان گذارید؛ خصوصاً داروهای زیر

آنتی‌بیوتیک‌ها – مثلاً: کلاریترومایسین، ریفامپین، تلیترومایسین؛

داروهای ضد قارچ – مانند: ایتراکونازول، کتوکونازول، پوساکونازول، وریکونازول؛

telaprevir یا boceprevir) c داروهای هپاتیت

داروی مخمر سنت جان؛

، (Evotaz, Stribild, Prezcoibx, Tybost) داروهای ایدز یا اچ آی وی – مانند: آتازانویز، کوبیسیتات

فوسامپرنایر، ایندینایر، نلفینایر، ریتونایر، ساکوینایر؛

داروهای تشنج – مانند: کاربامازپین، فوسفنی توئین، فنوباریتال، فنی توئین؛

بسیاری از داروهای دیگر (حتی شامل برخی از داروهای آزاد یا بدون نسخه) نیز ممکن است خطر خونریزی یا خطر

لخته شدن خون پیرامون مغز یا ستون فقرات را در فرد افزایش دهند. بسیار مهم است که هر دارویی که اخیراً استفاده کرده‌اید

را به دکترتان بگویید؛ مخصوصاً داروهای زیر

دابیگاتران، دالتپارین، انوکساپارین، فونداپارینوکس، هپارین، تینزاپارین، وارفارین، کومادین، جانتووین؛

، فلو وکسامین، پاروکستین، (Prozac) داروهای ضد افسردگی – مانند: سیتالوپرام، دولوکستین، اسیتالوپرام، فلوکستین

، ترازودون، ونلافاکسین، ویلازودون؛ (Zoloft) سرتالین

، سلکوکسیب (Aleve)، ناپروکسن (Advil, Motrin) داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی – مانند: ایبوپروفن

، دیکلوفناک، ایندومتاسین، ملوکسیکام و غیره؛ (Celebrex)

سالیسیلات ها – مانند: آسپیرین و غیره؛

البته لیست بالا همه‌ی داروهای که با آپیکسابان تداخل دارند را در بر ندارد و سایر داروها نیز ممکن است با این دارو

تداخل داشته باشند؛ اعم از داروهای با نسخه و بدون نسخه، ویتامین ها و داروهای گیاهی (۶)

۱. Razavi Pharmaceutical Services [Available from: <https://www.rpsi.ir>.

۲. Zaghari Tafreshi M, Rasouli M, Tabatabaee A, Golmakani E, Mortazavi H. Utilization of of complementary and alternative medicine in nursing with emphasis on the touch therapy. Journal North Khorasan University of Medical Sciences. 2014;6(1):207-13.

۳. Caspian Pharmaceutical Company [Available from: <https://www.caspiantamin.com>.

۴. Company Ed. darooyab [Available from: <https://www.darooyab.ir/>.

۵. <https://wwwdarooyabir/G-4798/Rivaroxaban>.

۶. <https://redmag.ir/>.

با تشکر از همکاری خانم دکتر شریف زاده در تایید مطالب و پرسنل محترم آی سی یو جنرال، خانمها:

مریم اشرف زاده، فاطمه سهرابی، زهرا کشاورزی، مرضیه دهقان، فرناز بیگ مرادی، مینا آنایی، فاطمه جعفری، سلیمه حسنی سعدی، زهرا سلطانی و نسترن اسدی

و با تشکر از زحمات بی دریغ سرپرستار محترم، سرکار خانم شعاعی

