



سولامر

اشکال دارویی: کپسول ۸۰۰ میلی گرم / پودر رنولا

موارد مصرف: کاهش سطح سرمی فسفر در بیماران نارسایی کلیوی مزمن که همودیالیز میشوند/ بمنظور جلوگیری از هایپوکلسمی (کاهش کلسیم خون) ناشی از افزایش فسفر

عوارض جانبی: اسیدوز متابولیک، درد شکمی، یبوست، نفخ، التهاب صفاق، استفراغ، تهوع، اسهال، سوءهاضمه، سردرد، افزایش یا کاهش فشارخون، ترومبوز، افزایش سرفه، عفونت.

تداخل دارویی: در صورت مصرف همزمان ممکن است جذب داروهای دیگر را کاهش دهد (با فاصله مصرف شود)، ممکن است جذب ویتامین های دی، ای، کا و فولیک اسید را کاهش دهد (با غذا تجویز شود)، کاهش جذب داروهای ضدآریتمی و ضدصرع، اثر سیپروفلوکساسین را تا ۵۰٪ کاهش میدهد (یک ساعت قبل یا ۳ ساعت بعد مصرف شود).

منع مصرف: سابقه حساسیت به دارو، هایپوفسفاتی (کاهش فسفات خون) و انسداد

روده.



احتیاطات: دارو بدون شکستن و خورد شدگی مصرف شود، همراه با غذا میل شود، بیمار از نظر ترومبوز تحت نظر باشد، اختلال بلع و تحرک دستگاه گوار، جراحی های بزرگ دستگاه گوارش.

نفروریت

اشکال دارویی: قرص

دسته دارویی: مکمل غذایی/دارویی حاوی زینک فاقد قند مخصوص بیماران کلیوی.

اجزای تشکیل دهنده: ویتامین های (ب۱۲، ب۱۱، ب۶، ای، ب)، اسید آسکوربیک، بیوتین، زینک، اسید فولیک و...



موارد مصرف: این قرص تنها مکمل مناسب بیماران کلیوی در ایران است که در سلامتی و نگهداری بافت ها، تقویت و بهبود عملکرد سیستم ایمنی و عصبی و حفظ سلامت دستگاه های مختلف بدن در بیماران کلیوی موثر است.

عوارض مصرف: مصرف ب ۶ ممکن است باعث خواب آلودگی، تهوع و سردرد شود، واکنش های آلرژیک با مصرف نوع خوراکی یا تزریقی فولیک اسید ممکن است مشاهده شود، ویتامین ب ۱۲ ممکن است باعث اسهال زودگذر، خارش و جوش های زودگذر و تورم شود.

مهم==مصرف این مکمل همزمان یا قبل از دیالیز باعث دفع آن از بدن میگردد لذا بهترین زمان مصرف بعد از دیالیز یا قبل از درمان بعدی میباشد.

کلسی تریول

اشکال دارویی: کپسول ۰.۲۵ میلی گرم، آمپول کلسی تریول، موضعی

طبقه بندی: ویتامین، شکل فعال ویتامین دی، عوامل تغذیه ای و ویتامین ها



موارد مصرف: هیپوکلسمی (کاهش کلسیم خون)، برای پیشگیری و درمان راشیتیس و درمان کمبود کلسیم خون همراه با کم کاری پاراتیروئید، بصورت موضعی در درمان پسوریازیس.

منع مصرف: در هایپرکلسمی (بالا بودن کلسیم خون)، هیپرویتامینوز دی و استیویدیستروئیدی کلیوی همراه با زیادی فسفات خون نباید مصرف شود.

عوارض جانبی: با مصرف مقادیر بیش از حد این ویتامین بی اشتها بی، تهوع و استفراغ، اسهال، کاهش وزن، تکرر ادرار، تعریق، سردرد، تشنگی، سرگیجه و افزایش غلظت کلسیم و فسفات در پلاسما و ادرار گزارش شده است.

تداخلات دارویی: مصرف همزمان داروهای آنتی اسید حاوی منیزیم، بویژه در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی، مصرف همزمان با مقادیر زیاد فرآورده های حاوی کلسیم یا مدرهای تیازیدی، مصرف همزمان سایر مشتقات ویتامین دی با این دارو ممکن است موجب مسمومیت شود.

تهیه کننده : نیلوفر حیدری

ویرایش: اول

تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۱۸

صفحه: ۱ از ۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان

عنوان سند: مجله دارویی آموزش به بیمار بخش اکسس

کد سند: NO-BK-۳۲۲



منابع:

فرهنگ داروهای ژنریک ایران ۱۳۸۷

www.fa.m.wikipedia.org

www.darooyab.ir

www.darubama.com

www.darouapp.ir

