

سفازولین

یک آنتی بیوتیک از نسل سفالوسپورین ها بوده و در عفونت‌های ریوی ادراری-تناسلی، پوست، بافت نرم، استخوان و مفاصل استفاده می شود و نیمه عمر آن ۱.۵-۲.۵ ساعت می باشد.

واکنش های نا خواسته و عوارض جانبی

سرگیجه، سر درد، بی حالی، راش های اریتماتو، کهپیر، تهوع، اسهال و استفراغ

توجهات بالینی

- کنترل I.O در بیمار کنترل گردد و سطح BUN و Cr کنترل گردد.
- در صورت بروز اسهال شدت و شک به کولیت دارو بایستی قطع گردد.

آموزش به بیمار

- در صورت بروز علائم ثانوی و مدفوع شل و آبکی و آلرژی را به پزشک اطلاع دهد.
- در صورت بروز تب و اسهال به خصوص در صورتیکه حاوی خون، موکوس و چرک باشد به پزشک اطلاع دهد.

سیپروفلوکساسین

یک آنتی بیوتیک بوده و در عفونت های خفیف تا متوسط دستگاه ادراری ناشی از ارگانیزم های حساس، اسهال عفونی، عفونت های خفیف تا متوسط دستگاه تنفس، عفونت های استخوان و مفاصل استفاده می گردد.

تداخلات

مصرف همزمان این دارو با تتوفیلین با افزایش سطح سرمی تتوفیلین می شود
مصرف آنتی اسیدها باعث کاهش جذب این دارو می شود

واکنش های نا خواسته و عوارض جانبی

سردرد، بی قراری، سر گیجه، بی خوابی، کابوس های شبانه، توهمات، تشنج، لتارژی، خواب آلودگی، ضعف، خستگی، بی اشتها، افسردگی، طپش قلب، آنژین صدری، راش، خارش، کهیر، خشکی، درد مفصلی، طعم ناخوشایند دهان

توجهات بالینی

- از مصرف همزمان آنتی اسید ها این دارو خودداری شود و در صورت لزوم باید بین تجویز و دارو حداقل ۴ ساعت فاصله وجود داشته باشد
- در بیماران دچار اختلال عملکرد کلیه دوز دارو را باید بر اساس کلیرانس کراتین تنظیم نمود
- در هنگام تجویز این دارو جهت کاهش خطر کریستالوری باید اسیدیتیه ادرار کمتر از ۶.۸ باشد
- بیماران در هنگام مصرف باید کاملاً هیدراته باشند
- میزان جذب و دفع بیمار کنترل گردد
- مصرف این دارو همراه با مشتقات تیوفیلین و یا کافئین ممکن است منجر به تحریک سیستم مغز و اعصاب گردد

آموزش به بیمار

- بیمار را به مصرف مایعات فراوان تشویق نمایید
- مصرف این دارو سبب خواب آلودگی می شود به بیمار توصیه نمایید تا مشخص شدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هوشیاری بپرهیزد
- از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کند

کلیندامایسین

یک آنتی بیوتیک است که در عفونت های ناشی از ارگانیس‌م‌های حساس استفاده می گردد

واکنش های ناخواسته و عوارض جانبی

راش کهیر درماتیت تماسی تهوع استفراغ درد شکمی اسهال بی اشتها بی مدفوع خونی دیسفاژی ترومبو فلبيت در صورت ایجاد اسهال طولانی یا واکنش افزایش حساسیت مصرف دارو باید قطع گردد

توجهات بالینی

جهت پیشگیری از از اوزوفازیت کپسول را به همراه یک لیوان آب تجویز نمود
در تجویز وریدی فشار خون و نبض بیمار را کنترل نمایید

آموزش به بیمار

- در صورت فراموشی دوز تجویزی آن را در اولین فرصت ممکن مصرف نمایید حداقل فاصله بین مصرف دوز فراموش شده و دوز بعدی ۲ تا ۴ ساعت باشد
- در صورت بروز اسهال کرامپ شکمی، تب یا وجود خون در مدفوع سریعاً به پزشک مراجعه نمایید
- به بیمار توضیح داده شود که به دنبال تزریق وریدی طمع تند و تلخی در دهان حس خواهد کرد که

مسئله مهمی نیست

هپارین

یک داروی ضد انعقاد است که در ترومبوز وریدهای عمقی آمبولی ریه استفاده میگردد

تداخلات

خطر بروز خونریزی به دنبال مصرف همزمان این دارو با داروهایی که بر فعالیت پلاکت ها اثر می گذارد نظیر آسپرین داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی افزایش میابد

واکنش های ناخواسته و عوارض جانبی

خونریزی ترومبوسیتوپنی تحریک بافتی درد خفیف راش اکیموز واکنش افزایش حساسیت

توجهات بالینی

- قبل از تجویز و شروع دارو تست های انعقادی بیمار را کنترل نمایید
- در هنگام تزریق زیر جلدی ناحیه را ماساژ نداده و آسپیره نکنید
- از تزریق در شعاع ۵ سانتی متری ناف خودداری کنید
- قبل از شروع درمان و سپس در فواصل منظم در خلال درمان تست های انعقادی و شمارش پلاکت ها را به عمل آورید
- به طور معمول دوز دارو باید به نحوی تنظیم شود که بیمار به سطح یک و نیم دو و نیم برابر کنترل طبیعی برسد

- کنترل بیمار بر اساس وضع بیمار و در جریان خونریزی فعال باید دارو قطع شود

آموزش به بیمار

- در طول دوره درمان با این دارو از تزریقات داخل عضلانی و انجام فعالیت هایی که منجر به آسیب می شوند پرهیز کند و از مسواک نرم استفاده کند
- در طول درمان با این دارو از مصرف آسپرین و یا ایبوپروفن پرهیز کنید
- علائم مربوط به خونریزی یا خون مردگی غیر عادی را سریعاً به پزشک اطلاع دهید
- قبل از شروع هر نوع درمان یا انجام اعمال جراحی پزشک و دندانپزشک را در جریان رژیم دارویی خود قرار دهد

استامینوفن

ضد درد غیر مخدر

این دارو باعث افزایش استانه درد میشود که اوج اثر این دارو ۱ تا ۳ ساعت و مدت اثر آن ۳ الی ۴ ساعت

میباشد

واکنش های ناخواسته و عوارض جانبی

راش، کهیر، خارش، تهوع، اسهال، درد شکمی، کاهش اشتها، ادرار خونی یا کدر، ضعف و خستگی

توجهات

- استامینوفن را میتوان خرد کرد و با مایعاتی که فرد دوست دارد مخلوط نمود
- مصرف همزمان این دارو با غذاهای غنی از کربوهیدرات جذب دلو را به تاخیر می اندازد
- شیاف استامینوفن را باید در یخچال نگهداری کرد.
- استامینوفن را باید همراه با یک لیوان آب مصرف نمود
- هم با معده خالی و هم به همراه غذا می توان دارو را مصرف کرد

سفالکسین

انتی بیوتیک

این دارو در عفونت های ریوی، ادراری، پ.ست . بافت نرم، استخوان . مفاصل استفاده میگردد
اوج اثر این دارو یک ساعت می باشد و مدت اثر آن ناشناخته می باشد

واکنش های ناخواسته و عوارض جانبی

سرگیجه، سر درد، کهیر، تهوع، بی اشتها، اسهال، کرامپ های شکمی، تنگی نفس، تب، ترشح و خارش
واژینال، مدفوع شل . ابکی

سفالکسین توسط اسید معده تخریب نمی شود ولی هنگامی که با غذا مصرف شود حداکثر سطح سرمی
مختصری پایین بوده و با تاخیر ایجاد می شود

سوسپانسیون سفالکسین را پس از تهیه حداکثر تا ۱۴ روز داخل یخچال می توان نگهداری کرد

توجهات

- در صورت درمان دراز مدت تستهای عملکرد کبد و کلیه را به صورت دوره ای انجام دهید
- از نظر بروز علائم واکنش حساسیت تحت نظر داشته باشید
- در صورت بروز علائم عفونت ثانوی (ترشح و خارش واژینال، مدفوع شل . ابکی) و الرژی را به پزشک اطلاع دهید
- در صورت بروز تب و اسهال به خصوص در صورتیکه حاوی خون، موکوس و چرک باشد به پزشک اطلاع دهید

استامینوفن

ضد درد غیر مخدر

این دارو باعث افزایش استانه درد میشود که اوج اثر این دارو ۱ تا ۳ ساعت و مدت اثر آن ۳ الی ۴ ساعت میباشد

واکنش های ناخواسته و عوارض جانبی

راش، کهیر، خارش، تهوع، اسهال، درد شکمی، کاهش اشتها، ادرار خونی یا کدر، ضعف و خستگی

توجهات

- استامینوفن را میتوان خرد کرد و با مایعاتی که فرد دوست دارد مخلوط نمود

- مصرف همزمان این دارو با غذاهای غنی از کربوهیدرات جذب دلرو را به تاخیر می اندازد
- شیاف استانیونفن را باید در یخچال نگهداری کرد.
- استامینوفن را باید همراه با یک لیوان آب مصرف نمود
- هم با معده خالی و هم به همراه غذا می توان دارو را مصرف کرد

سفالکسین

انتی بیوتیک

این دارو در عفونت های ریوی، ادراری، پ.ست . بافت نرم، استخوان . مفاصل استفاده میگردد
اوج اثر این دارو یک ساعت می باشد و مدت اثر آن ناشناخته می باشد

واکنش های ناخواسته و عوارض جانبی

سرگیجه، سر درد، کهیر، تهوع، بی اشتهایی، اسهال، کرامپ های شکمی، تنگی نفس، تب، ترشح و خارش
واژینال، مدفوع شل . ابکی

سفالکسین توسط اسید معده تخریب نمی شود ولی هنگامی که با غذا مصرف شود حداکثر سطح سرمی
مختصری پایین بوده و با تاخیر ایجاد می شود

سوسپانسیون سفالکسین را پس از تهیه حداکثر تا ۱۴ روز داخل یخچال می توان نگهداری کرد

توجهات

- در صورت درمان دراز مدت تستهای عملکرد کبد و کلیه را به صورت دوره ای انجام دهید
- از نظر بروز علائم واکنش حساسیت تحت نظر داشته باشید
- در صورت بروز علائم عفونت ثانوی (ترشح و خارش واژینال، مدفوع شل . ابکی) و الرژی را به پزشک اطلاع دهید
- در صورت بروز تب و اسهال به خصوص در صورتیکه حاوی خون، موکوس و چرک باشد به پزشک اطلاع دهید

