

نیتروکانتین:

برای پیشگیری و درمان آنژین صدری حادومزمن مصرف میشود.

تداخلات دارویی:

این دارو با قرص سیلدنافیل تداخل دارد.

عوارض:

سر درد سرگیجه و افزایش تعریق است.

آسپرین:

درمان اولیه آنژین پکتورس و انفارکتوس میوکارد مصرف میشود تا نیم ساعت بعد از خوردن این دارو دراز نکشید.

تداخلات دارویی:

این دارو با قرص های کتورولاک، ایبوپروفن تداخل دارد.

عوارض دارویی:

آریتمی قلبی، سردرد، درد و سوزش سردل، کاهش شنوایی، زخم گوارشی

اسویکس:

مصرف این دارو به همراه آسپرین بعد از سکت قلبی و مغزی حداقل به مدت یکسال سبب کاهش حملات

قلبی و مغزی میشود.

تداخلات دارویی:

مپرازول، فلوکسیتین، فلوکونازول

عوارض:

خونریزی خفیف، علایم شبه آنفلونزا، درد قفسه سینه، سرگیجه

آتورواستاتین:

به عنوان داروی کمکی همراه با رژیم غذایی در درمان زیادی چربی خون مصرف میشود و باعث کاهش

غلظت کلسترول میشود مصرف این دارو در زنان باردار ممنوع میباشد. این دارو با گریپ فروت خورده نشود.

تداخلات دارویی:

جم فیروزیل، کلسی سین، کلاریترومایسین

عوارض:

درد عضلانی، درد مفاصل، کابوس شبانه

فوروزماید:

به عنوان داروی کمکی در درمان زیادی فشارخون است که ادرار آور میباشد. منع مصرف در افرادی دارد که دچار بیماری نقرس میباشد. این دارو باعث کاهش کلسیم و پتاسیم و افزایش اوره خون میشود که انجام آزمایشات دوره ای توصیه میشود.

تداخلات دارویی:

آمیکاسین، جنتامایسین

عوارض:

افت فشارخون، وزوز گوش، سرگیجه

وارفارین:

داروی ضد انعقاد میباشد در صورت اقدام جراحی و قصد بارداری پزشک خود را مطلع سازید. خوردن سیر باعث افزایش اثر این دارو میشود.

تداخلات دارویی:

آلوپورینول، آمیودارون، آزیترومایسین

عوارض:

خونریزی شدید، درد شکمی، واکنش ازدیاد حساسیت

بیزوپرولول:



در درمان فشارخون بالا و آنژین صدری و سگته قلبی استفاده میشود و باعث کنترل نارسایی قلبی متوسط تا شدید میشود.

تداخلات دارویی:

دیگوکسین، آتنولول، کارودیلول

عوارض:

درد قفسه سینه، سرگیجه، بی خوابی، سرفه

پنتوپرازول:

درمان زخم های خوش خیم معده و دوازدهه داده میشود و باعث کاهش اسید معده در جراحی میشود.

تداخل دارویی:

دیگوکسین

عوارض:

سر درد، درد قفسه سینه، استفراغ، تهوع

اسپیرونولاکتون:

به عنوان داروی کمکی در کنترل نارسایی احتقانی قلب میباشد.

تداخل دارویی:

تریامترن اچ

عوارض:

بزرگ شدن و درد پستانها، اسهال، خونریزی گوارشی، زخم گوارشی

لوزارتان:

این دارو باعث کاهش فشارخون میشود.

تداخل دارویی:

کاپتوپریل

عوارض:

سرفه، سرگیجه

متوپرولول:

در درمان آنژین صدری مزمن و پیشگیری از انفارکتوس مجدد میوکارد میشود.

تداخل دارویی:

کلرپرومازین، بیزوپرولول، دیگوکسین

عوارض:

سرگیجه، خستگی، سردرد

منبع: کتاب فارماکولوژی

تهیه کنندگان: محبوبه ماهانی پور_ طیبیه اقبالی

بخش جراحی قلب

