



آموزش

نام دارو

ردیف

۱	کلسیم کربنات Caco3 500mg	این دارو فسفر بایندر کلسیمی است. هم سطح کلسیم را افزایش می دهد و هم با اتصال به فسفات در معده، مانع جذب فسفر می گردد. اگر هدف از درمان، اصلاح کلسیم است دارو با معده خالی خورده شود. اگر هدف اصلاح فسفر است باید با غذا خورده شود. با آهن، آنتی بیوتیک ها، دیگوکسین و لووتیروکسین تداخل دارد.
2	کلسیتریول Calcitriol 0.25 mg	این دارو شکل فعال ویتامین د است و سطح کلسیم را افزایش می دهد در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی، غلظت هورمون پاراتورمون را کاهش می دهد (PTH). عوارض: مهم ترین عارضه افزایش بیش از حد کلسیم و فسفر است که با کنترل دوره ای کلسیم می توان از آن جلوگیری کرد.
3	سولامر Sevelamer 800 mg	سولامر دارویی است که به منظور کنترل فسفر در افراد مبتلا به بیماری مزمن کلیه تجویز می شود. حتما باید با غذا خورده شود. حالت تهوع، استفراغ، درد معده، از بین رفتن اشتها، اسهال، یبوست، درد مفاصل از عوارض شایع مصرف سولامر است. با سیپروفلوکساسین، سیکلوسپورین و لووتیروکسین و آهن تداخل دارد.
4	سیناکلسنت Cinacalcet (30 – 60- 90) mg	سیناکلسنت فعالیت غده پاراتیروئید را مهار می کند. همچنین کلسیم بیش از حد خون را کاهش می دهد. بهتر است همراه با غذا و یا اندکی پس از غذا مصرف شود. کاهش کلسیم خون یکی از عوارض شایع می باشد. در بیمار مبتلا به صرع با احتیاط مصرف شود.
5	اپرکس Eprex 4000-1000	

تهیه کننده: مینا شریفی

