



هیدروکسی کلروکین سولفات

موارد مصرف

- پیشگیری و درمان حملات حاد بیماری مالاریا
- درمان بیماری آرتریت روماتوئید
- درمان بیماری لوپوس اریتماتوس

عوارض

- بیماری ماهیچه قلب و آریتمی های بطنی قلبی
- سمیت شبکیه چشم
- تشدید بیماری پسوریازیس
- کم خونی
- درگیری عضلات اسکلتی و نورون ها
- افت قند خون

تداخلات دارویی

- (۱) اثر انسولین و داروهای ضد دیابت را افزایش می دهد در نتیجه خطر کاهش قند خون را زیاد می کند .
- (۲) مصرف همزمان با داروی متوترکسات باعث افزایش بروز عوارض جانبی می شود.
- (۳) در صورت مصرف همزمان داروی سیکلوسپورین و هیدروکسی کلروکین افزایش سطح سیکلوسپورین پلاسما گزارش شده است .
- (۴) مصرف همزمان با داروی دیگوکسین باعث افزایش سطح دیگوکسین می شود .
- (۵) داروهای آنتی اسید می توانند جذب کلروکین را کاهش دهد بنابراین حداقل ۴ ساعت فاصله بین مصرف آنها باید رعایت شود.



هشدارها

- ✓ به صورت پایه ای و پس از آن هر ۶ ماه یکبار ، طی درمان طولانی مدت تست های چشمی باید انجام شود .
- ✓ بیمار از نظر مسمومیت گوشه علائمی مانند وزوز گوش ، سرگیجه ، تغییر میزان شنوایی و ... باید بررسی شود .

ریتوکسی مب

موارد مصرف

- درمان لنفوم
- درمان بیماری آرتریت روماتوئید

عوارض

- آریتمی قلبی
- کاهش تعداد گلبول های سفید خون
- کاهش ضربان قلب
- سردرد
- افت فشار خون

تداخلات دارویی

- (۱) این دارو باعث مهار پاسخ به واکسن ها می گردد .
- (۲) این دارو باعث تشدید اثرات سرکوب کننده ی سیستم ایمنی می گردد .
- (۳) این دارو باعث تشدید اثرات سرکوب کننده ی مغز استخوان می گردد .

هشدارها



- ✓ آزمون های شمارش کامل خونی و پلاکتی باید به طور منظم انجام شود .
- ✓ به منظور جلوگیری از کم آبی بدن ، باید مصرف مایعات را به ۲-۳ لیتر در روز را افزایش دهید .
- ✓ از تزریق واکسن های زنده ویروسی طی درمان اجتناب ورزید .

اندوکسان (سیکلوفسفامید)

موارد مصرف

- داروی شیمی درمانی
- درمان سرطان سینه و ریه
- درمان لوسمی لنفوبلاستیک
- التهاب و ضعف عضلات
- برای کاهش رد پیوند
- درمان بیماری آرتریت روماتوئید
- درمان بیماری لوپوس اریتروماتوز
- درمان سندرم نفروتیک در اطفال

عوارض

- تهوع
- استفراغ
- ریزش مو
- افزایش اوریک اسید خون
- کاهش اشتها



تداخلات دارویی

- ۱) داروی فنوتیازین
- ۲) داروی آلوپرینول
- ۳) داروی ایمی پرامین
- ۴) ویتامین A

آلبومین

موارد مصرف

- شوک
- کاهش پروتئین
- سوختگی
- سندرم دیسترس تنفسی حاد
- کاهش آلبومین
- افزایش بیلی روبین و زردی

عوارض

- تب و لرز
- افزایش ضربان قلب
- ادم ریه
- تغییرات فشار خون

تداخلات دارویی



۱) داروی وراپامیل

۲) محلول های حاوی الکل

۳) محلول های اسیدآمینه

هشدارها

✓ هرگز تجویز آلومین را به فرد دیگری حتی با علائم مشابه تجویز نکنید

✓ قبل از تجویز پزشک را از موارد زیر مطلع کنید

۱. بارداری یا قصد بارداری

۲. شیردهی

۳. کم خونی شدید

۴. فشارخون بالا

۵. خونریزی یا اختلال لخته شدن خون مثل بیماری هموفیلی

۶. مشکلات دفع ادرار

۷. مشکلات ریوی

✓ در هنگام تزریق باید علائم حیاتی بیمار بدقت تحت پایش قرار گرفته باشد

✓ دارو در جای خشک و خنک و به دور از گرما و تابش نور مستقیم نگهداری شود

آلوپرینول

موارد مصرف

- پیشگیری از حملات حاد نقرس
- جلوگیری از عود سنگهای اگزالاتی کلسیم

عوارض



➤ کهیر

➤ نارسایی کلیه

➤ کاتاراکت یا آب مروارید

➤ مشکلات شدید کبدی

تداخلات دارویی

(۱) داروی آموکسی سیلین

(۲) داروی آمپی سیلین

(۳) داروی وارفارین

(۴) داروی تتوفیلین

(۵) داروی سیکلوفسفاماید

هشدارها

✓ بدلیل عوارض گوارشی این دارو توصیه میشود همراه با غذا یا بعد از غذا با مقدار کافی آب مصرف شود.

✓ سطح اسید اوریک خون هر ۲ هفته یکبار کنترل شود .

✓ به منظور پیشگیری از تشکیل سنگ مصرف روزانه مایعات را به ۲ لیتر برسانید .

✓ استفاده از فراورده های لبنی در رژیم غذایی به منظور قلیایی کردن ادرار .

✓ از مصرف الکل و کافئین اجتناب ورزید زیرا می تواند سبب افزایش سطح اسید اوریک شود .

متیل پردنیزولون



موارد مصرف

- درمان جایگزینی در نارسایی غده فوق کلیوی
- سرکوب کننده سیستم ایمنی
- درمان بیماری های روماتیسمی
- درمان ادم مغزی

عوارض

- نارسایی قلبی
- افزایش فشار خون
- زخم گوارشی
- راش
- افزایش احتمال عفونت

تداخلات دارویی

- (۱) تشدید افزایش قند خون
- (۲) تشدید اثرات افزایشنده فشارخون
- (۳) تشدید کاهش پتاسیم خون

هشدارها

- ✓ استفاده طولانی مدت در کودکان باعث مهار رشد می شود .
- ✓ در افراد مسن و خانم های یائسه باعث ایجاد پوکی استخوان و فشار خون بالا میشود .
- ✓ معاینات چشم پزشکی در طول درمان دراز مدت به طور مرتب باید انجام شود .

پتاسیم کلراید



موارد مصرف

- درپیشگیری و درمان پتاسیم در مواردی که جایگزین آن از طریق خوراکی میسر نباشد
- درمان مسمومیت با داروی دیگوکسین
- درمان بعضی از آریتمی های قلبی

عوارض

- بی حسی و ضعف
- زخم گوارشی
- کاهش حجم ادرار
- افزایش پتاسیم خون

تداخلات دارویی

- ۱) مصرف همزمان با برخی داروهای مدر احتمال افزایش پتاسیم خون را مطرح می کند .
- ۲) مصرف همزمان با برخی داروها احتمال زخم و تحریک گوارشی را به همراه دارد بنابراین حتما با تایید و دستور پزشک این دارو مصرف شود .

هشدارها

- ✓ از تزریق مستقیم دارو بعلت غلیظ بودن فرآورده اجتناب گردد .
- ✓ طی دوره ی درمان باید پتاسیم سرم معادل ۳/۵ تا ۵ میلی گرم در دسی لیتر نگه داشته شود بنابراین آزمایشات دوره ای خون پیشنهاد می شود .

فوروزمایید (لازیکس)

موارد مصرف



- افزایش فشار خون
- افزایش کلسیم خون
- ادم حاد ریه
- نارسایی مزمن کلیه

عوارض

- کم آبی بدن
- کاهش گلبول های سفید خون
- کاهش کلسیم خون

تداخلات دارویی

- ۱) مصرف همزمان با داروهای ضد فشار خون احتمال افت فشارخون را بالا میبرد .
- ۲) این دارو اثر داروهای ضد انعقاد های خوراکی را افزایش می دهد .
- ۳) این دارو اثر داروهای کاهنده ی قند خون را کاهش می دهد .
- ۴) این دارو دفع لیتیوم را کاهش می دهد .

هشدار ها

- ✓ فشار خون در دو حالت خوابیده و ایستاده کنترل شود تا از ایجاد افت فشار خون وضعیتی جلوگیری شود .
- ✓ لازم است از رژیم غذایی پرپتاسیم پیروی شود .
- ✓ الکترولیت های سرم طبق آزمایش روتین اندازه گیری شود .
- ✓ باید علامت گیجی خصوصا در سالمندان مد نظر باشد و رعایت اقدامات حفاظتی و امنیتی ضروری می باشد .



تهیه کننده

زهرا سرحدی

کارشناس پرستاری

منبع : کتاب داروهای ژنریک ایران

نویسنده : مرجان رسولی



مجلات دارویی