



آلبومین: به عنوان مهمترین پروتئین خون برای جایگزین کردن حجم خون از دست رفته در اثر آسیب دیدگی و جراحات مثل سوختگی های شدید یا جراحی که باعث خونریزی شدید می شود مورد استفاده قرار می گیرد.

در صورت ابتلا به شرایط زیر نباید از آلبومین استفاده شود:

کم خونی شدید- فشار خون بالا- مشکلات ریوی- بیماری کلیوی- خونریزی یا لخته شدن خون- ناتوانی در ادرار کردن-

عوارض جانبی: سرفه- تاول- کهیر- تنگی نفس- ورم صورت ، لب ها، زبان و گلو- سبک شدن سر- ضعف- سردرد شدید- تاری دید- وزوز گوش- اضطراب – سرگیجه و تب و لرز
توجه: این محلول نباید سریع انفوزیون شود تزریق براساس سن بیمار و تشخیص بیماری تعیین می شود و فاقد مواد نگهدارنده است باید پس از باز شدن مصرف شود.
اینترالیپید: منبع کالری و اسید چرب ضروری است. اسیدهای چرب برای تولید انرژی می باشند.

تداخلات دارویی: آلبومین- آمپی سیلین- آمیکاسین- پتاسیم کلراید- پنی سیلین- تتراسیکلین- فنی توئین پ

نگهداری : در درجه حرارت کمتر از ۲۵ و از انجماد جلوگیری شود.

موارد منع مصرف: پانکت حاد- چربی خون بالای پاتولوژیک

سرم آمینواسید: برای تولید پروتئین مورد نیاز است. میزان تجزیه پروتئین را کاهش می دهد و التیام زخم را تسریع می کند.

منع مصرف: در نارسایی شدید کلیوی- امراض شدید کبدی- آنسفالوپاتی

عوارض جانبی: فلبیت در محل تزریق- تهوع- تب- برافروختگی پوست- سرگیجه- عرق مفرط- وجود گلوکز در ادرار



تداخلات دارویی: نباید به طور همزمان با خون انفوزیون شود.

سفتریاکسون: به منظور پیشگیری از عفونت استفاده می شود.

منع مصرف: در صورت سابقه حساسیت به پنی سیلین

عوارض جانبی: راش پوستی- اسهال- گر گرفتگی- تپش قلب- افزایش تعریق- خارش- درد شکمی- اختلال چشایی- تهوع و استفراغ- افزایش سطح پلاکت خون

ایمی پنم: جهت درمان عفونت هایی مثل عفونت های افراد مبتلا به نقص ایمنی- عفونت های داخل شکمی- عفونت های استخوان و مفاصل- عفونت های پوست و بافت نرم – عفونت های راه ادراری – پنومونی اکتسابی از بیمارستان کاربرد دارد. به صورت وریدی یا داخل عضلانی عمیق تزریق می شود.

عوارض جانبی: افزایش ضربان قلب- تشنج- راش پوستی- اسهال- تهوع – استفراغ – عفونت معده ای روده ای – پروتئین در ادرار و تغییر رنگ ادرار.

مروپنم: در عفونت های باکتریایی استفاده می شود.

عوارض: شوک- ایست قلبی- کاهش تعداد ضربان قلب (برادیکاردی)- نارسایی قلب- درد قفسه سینه- سکت قلبی- سردرد- اضطراب- لرز- گیجی- خواب آلودگی- توهم- بی خوابی – تشنج – راش پوستی – خارش – زخم پوستی- کهیر – افت قند خون- تهوع- استفراغ – نفخ- بزرگ شدن شکم- سوزش ادرار-بی اختیاری ادرار – درد لگن

سفتازیدیم : در عفونت های باکتریایی استفاده می شود.

عوارض: خارش – راش پوستی- اسهال- افزایش سطح پلاکت خون- التهاب محل تزریق- تب و تشنج

منع مصرف: در صورت وجود حساسیت به پنی سیلین ها

کلیندامایسین: فقط بر عفونت های ناشی از باکتری ها موثر است. در صورت ابتلای بیمار به اسهال نباید مصرف شود.



عوارض: اسهال- احساس ناراحتی شکم- تهوع- استفراغ- بثورات جلدی

آمپی سیلین: یک آنتی بیوتیک رایج است. در درمان عفونت های گوناگون باکتریایی نظیر عفونت گوش میانی - سینوزیت-پوست- بافت نرم- دستگاه تنفس و دستگاه ادراری استفاده می شود.

عوارض: اسهال شدید یا خفیف ولی پایدار- سردرد- تهوع- استفراغ- زخم دهانی یا زبان- اختلالات ذهنی- زردی چشم ها و پوست.

در صورت بروز تورم لب ها دور- چشم ها- کهیر یا تورم های پوستی- تب- غش ناگهانی - ضربان قلب تند- خس خس سینه یا مشکل در تنفس بلافاصله دارو قطع شود.

ونکومايسين: در عفونت های باکتریایی استفاده می شود.

عوارض شایع: تهوع- استفراغ- اختلال چشایی - راش صورت

موارد منع مصرف: حساسیت زیاد نسبت به دارو

سفازولین: در کودکان مصرف می شود

عارضه جانبی شایع ندارد.

منع مصرف: در صورت حساسیت به پنی سیلین ها

انوکسپارین: داروی ضد لخته می باشد. جلوگیری از آمبولی پس از جراحی یا در بیماران بستری به دلیل کاهش تحرک- استفاده از دارو در دوران بارداری می تواند باعث نقایص مادرزادی در جنین شود.

عوارض جانبی: کهیر- خونریزی- کاهش تعداد پلاکت

موارد منع مصرف: در مبتلایان به خونریزی شدید- کاهش تعداد پلاکت- در بیمارانی که دریچه های قلبی مصنوعی دارند توصیه نمی شود.

هپارین: جلوگیری از آمبولی - داروی ضد انعقاد می باشد.



مصرف آن در دوران شیردهی بدون خطر است.

موارد احتیاط: بیماری کبدی یا کلیوی خفیف- الکلیسم- سابقه آسم- آلرژی_ زخم گوارشی

عوارض: خونریزی - کاهش تعداد پلاکت.

کپسول زینک سولفات: جهت کمبود روی استفاده می شود. به عنوان مکمل غذایی روزانه همراه با غذا مصرف شود. در صورت بروز تهوع- اسهال - بثورات پوستی- استفراغ شدید- اتلاف آب بدن و بی قراری مصرف دارو را کاهش داده و یا مصرف آن را تا کنترل علائم قطع کنید. در صورت بروز دل آشوبه دارو را همراه با غذا یا شیر میل کنید.

ویتامین ث: برای ترمیم زخم و مقاومت در برابر عفونت ضروری است. برخلاف بیشتر حیوانات انسان قادر به سنتز این ویتامین نیست.

عوارض جانبی: در دوز های بالا = تهوع- استفراغ- اسهال - سوزش سر دل- کرامپ شکمی - سردرد- بی خوابی- افزایش دفع ادرار - سوزش ادرار- فرسودگی دندان با مصرف طولانی قرص های جویدنی .

به دنبال مصرف سیگار نیاز به ویتامین ث افزایش می یابد.

مولتی ویتامین: در کمبود ویتامین ها استفاده میشود. در بالغین روزانه یک قرص طبق دستور پزشک در کودکان ۵ میلی لیتر شربت داده می شود.

پنتوپرازول: منجر به کاهش ترشح اسید معده می شود.

موارد منع مصرف: در بیماران حساس به دارو یا اجزای آن و در بیماران حساس به سایر جایگزین های آن

عوارض جانبی: اضطراب - سرگیجه- سردرد- بی خوابی- میگرن- درد قفسه سینه- سینوزیت- درد شکم- یبوست- اسهال - نفخ شکم- تهوع و استفراغ- تکرر ادرار- درد پشت- گردن درد- تنگی نفس- تشدید سرفه- عفونت مجرای تنفسی فوقانی- راش- عفونت.

تداخلات دارویی: آمپی سیلین- کتوکونازول- وارفارین- علف هزار چشم-



امپرازول: تولید اسید معده را مهار می کند. این دارو در برابر اسید معده حساس است. در زخم دوازدهه استفاده می شود.

منع مصرف: حساسیت مفرط به دارو

عوارض جانبی: سردرد - زردی - افزایش آنزیم های کبدی - سرکوب مغز استخوان -

این دارو را نیم ساعت قبل از غذا مصرف کرده و از باز کردن یا خرد کردن کپسول اجتناب کنید.

تهیه کننده: زهرا پرزیوند/ پرستار

منبع: مجله سلامتی و پزشکی پذیرش ۲۴ / بانک اطلاعات دارویی

انجمن داروسازان ایران دارویاب

