



داروهای مهم قلبی

قرص وارفارین: ضد انعقادی خوراکی است که سبب کاهش تشکیل لخته

خون و جلوگیری از آمبولی در بیماران قلبی می شود و در درمان بیماران قلبی خصوصا روماتیسم قلبی _ دریچه مصنوعی و درمان ترمبوز وریدی و آمبولی ریه کاربرد دارد در صورت اقدام به جراحی و قصد بارداری پزشک را مطلع نمایید

عوارض وارفارین: خونریزی خودبخودی و شدید مثلا خونریزی ناگهانی از لثه _ تهوع _ درد شکمی _ بثورات جلدی _ اسهال _ خارش شدید _ طاسی

موارد منع مصرف: در بارداری

تداخلات دارویی: آلوپرینول _ آمیودارون _ آزیترومايسين و فروزماید

قرص آملودیپین + والسارتان

داروی ترکیبی جهت کاهش فشارخون است که کاهنده خطر سکته قلبی و حملات قلبی می باشد

عوارض: نفخ _ تورم صورت یا قوزک پا هیا دستها _ افزایش سریع وزن _ سوزن سوزن شدن دستها و پاها

رتیلاز: یک داروی مهم در حل کردن لخته خون که به بهبود کار قلب کمک می کند در بیمارانی که سابقه حمله قلبی داشته اند از مرگ و نارسایی قلب



پیشگیری می کند در درمان سکته قلبی البته تا زمانی که بیمار در تایم باشد کاربرد دارد

عوارض: خونریزی_ورم_تهوع_استفراغ_کاهش فشارخون_بی نظمی قلبی_درد قفسه سینه_خونریزی معده_خونریزی داخل جمجمه

قرص آسپرین: داروی ضد التهاب است اما کورتون نیست_برای کاهش درد قلبی و التهاب_تب بر_جلوگیری از لخته_پیشگیری از بیماریهای قلبی و رقیق کننده خون کاربرد دارد

عوارض مهم آسپرین: واکنش های آلرژیک_آریتمی_سوزش سردل_زخم گوارشی_سردرد و کاهش شنوایی

منع مصرف: آسم_بیماریهای کلیوی_خونریزی های گوارشی

تداخلات دارویی: این دارو با کتورولاک و ایبوبروفن_فروزماید تداخل دارد

قرص اسویکس: این دارو به همراه آسپرین بعد از سکته قلبی باعث کاهش حملات قلبی می شود

عوارض: سرگیجه درد قفسه سینه خ.نریزی خفیف و علایم شبه آنفلوآنزا

موارد منع مصرف: فعلا با تجویز پزشک

تداخلات دارویی: امپرازول_فلوکسیتین_فلوکونازول



قرص نیتروگانتین با دوزهای ۲/۶_۴/۶: باعث جلوگیری از درد قلبی و تسکین دردهای قلبی می شود که با شل و گشاد کردن رگهای قلبی باعث میشود خون بهتر و راحتتر به قلب برسد

عوارض مهم: سردرد که نشان دهنده تاثیر داروست_ سرگیجه_ تسریع ضربان قلب

توصیه میشود: بیمار آهسته و کم کم از جایش بلند شود و در صورت ادامه سرگیجه بنشیند

تداخلات دارویی: این دارو با قرص سیلدنافیل_ آسپرین_ داروهای سایکوز و ضد افسردگی ها تداخل دارد

قرص لوزارتان + هیدروکلروتیازید: این دارو در درمان فشار خون بالا کاربرد دارد و نیز کاهنده سکته قلبی است

عوارض مهم: افت فشارخون_ سرگیجه_ خارش_ تپش قلب_ بی اشتهایی
تداخلات دارویی: کاپتوپریل

قرص بیزوپرولول ۲/۵_۵: باعث آهسته تر شدن ضربان قلب می شود و معمولا یکبار در روز مصرف می شود

عوارض مهم: افت فشارخون و کندی بیش از حد ضربان قلب و سردرد_ سرگیجه_ ضعف_ خستگی_ کابوس دیدن در خواب یا بی خوابی

تداخلات دارویی: دیگوکسین_ کارودیلول_ آتنولول

قرص آتوواستاتین ۲۰ و ۴۰: کاهنده چربی خون است_ کلسترول بالا در خون رسوب می کند و به مرور باعث سخت و تنگ شدن دیواره عروق می



گردو در نهایت خطر سکتة قلبی را بالا می برد که این قرص باعث کاهش کلسترول خون می شود و بهترین زمان مصرف ساعت ۷ یا ۸ شب می باشد

عوارض مهم: درد و گرفتگی عضلات_ در صورت تنگی نفس و سرفه به پزشک مراجعه گردد و قطع ناگهانی دارو خطرناک است

تداخلات دارویی: جم فیروزیل_ کلشی سین_ کلاریترومایسین

آشنایی با برخی داروهای متداول فشارخون

آملودیپین: مسدود کننده کانال کلسیم بوده و معمولاً یکبار در روز تجویز می شود برای درمان آنژین قلبی نیز کاربرد دارد

کلرتالیدین: یک داروی دیورتیک یا به زبان ساده ادرار آور است معمولاً یکبار در روز و همراه غذا مصرف می شود ترجیحاً با صبحانه و همچنین برای درمان احتباس مایعات در بدن بر اثر نارسایی قلبی مفید است

انالایریل: برای فشار خون بالا معمولاً یکبار در روز مصرف می شود برای درمان نارسایی قلبی نیز تجویز می شود

هیدروکلروتیازید: دیورتیک است که یکبار در روز نصف می شود این دارو مانند سایر دیورتیک ها احتباس مایعات یا ادم را نیز درمان می کند

ایربسارتان: یکبار در روز تجویز می شود همچنین برای مشکلات کلیوی در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ تجویز می شود

لیزنپریل: یکبار در روز مصرف می شود و برای درمان نارسایی قلبی نیز تجویز می شود



لوزارتان داروی ضد فشارخون است در بارداری منع مصرف دارد مگر با دستور پزشک

متوپرولول: یک بتا بلوکر که در دونوع آهسته رهش و سریع رهش عرضه می شود همچنین باعث کاهش خطرات حملات قلبی مکرر می شود و برای آنزین و نارسایی احتقانی نیز تجویز می شود

عوارض: سرگیجه - خستگی - سردرد

تداخلات دارویی: کلروپرومازین - بیزوپرولول - دیگوکسین

والسارتان: برای درمان نارسایی قلبی و بالا بردن شانس زندگی پس از بروز حمله قلبی کاربرد داربرای درمان فشارخون نیز تجویز می شود و یکبار در روز مصرف می شود

بهترین زمان برای مصرف داروهای فشارخون: اگر دیورتیک یا ادرار آور مصرف می کنید بهترین زمان مصرف صبح هاست تا شب موقع خواب مجبور نباشید به دستشویی بروید

داروهای فشارخونی که بهتر است هنگام خواب صرف شوند: آملودیپین - متوپرولول - آوایرو (ایربسارتان) - انالاپریل - لوتنسین (بنازپریل هیدروکلراید)

زیرا این داروها به گونه ای طراحی شدند که به آرامی در بدن آزاد می شوند تا در ساعات صبح که فشارخون به اوج خود می رسد بیشترین اثر را داشته و باعث کاهش خطر سکته قلبی و مغزی می شود

تداخلات دارویی مهم

آسیرین و ضد انعقادها با فورزماید یا دیورتیکها

مصرف همزمان دیورتال ها و دیورتیکها باعث مسمویت با دیورتال می شود

پایان

جمع اوری کنندگان خانمها کاربخش و خوبیاری

منابع کتابهای فارماکولوژی و کتابهای گیسوم

