



مرکز آموزشی درمانی شفا

عنوان سند:

کد سند: NO-BK-410

عنوان: تخلیه چشم



تهیه کننده:

سمیه مسجدی پرستار بخش چشم

تنظیم کننده:

فرحناز نریمیسا سوپروایزر آموزش سلامت

محدودیت های شنا - ورزش شدید یا سایر فعالیت های بدنی سخت برای 2 تا 4 هفته محدود می شود.

همچنین باید تا یک ماه از خم شدن در ناحیه کمر و بلند کردن اجسام سنگین خودداری شود. مراقب باشید که بانداژی که چشم را می پوشاند خشک نگه دارید.

عوارض جراحی

خونریزی- عفونت - افتادگی پلک یا مشکل در بستن چشم

هنگامی که جراح متوجه شد که چشم به طور کامل بهبود یافته است می توانید پروتز سفارشی خود را نصب کنید اکثر بیماران 6 تا 8 هفته پس از جراحی برای پروتز خود آماده هستند.

با آرزوی سلامت و تندرستی

منابع: برونروسودارث 2018

جراحی برداشتن چشم ممکن است در مواردی مانند سرطان چشم یا به دنبال آسیب شدید یا عفونت چشم -ضربه -عفونت- ناهنجاریهای مادرزادی و تومورهای چشمی ایجاد شود و فرد یک چشم خود را از دست دهد و یا مجبور به تخلیه چشم شود. در طول عمل جراحی تمام چشم خارج می شود اما عضلات و سایر قسمت ها باقی می مانند .

بعد از عمل چشم شما با پانسمان حجیم پانسمان می شود چند روز بعد پانسمان برداشته می شود.

شما برای اولین ویزیت یک هفته پس از جراحی به پزشک مراجعه می کنید در این معاینه پانسمان برداشته می شود معمولا تورم و کبودی خفیفی مشاهده خواهید کرد که طی 2 هفته برطرف می شود.

چندروز بعد از عمل بیمار باید استراحت کند چون طی چند روز اول پانسمان برداشته نمی شود به مدت یک هفته آنتی بیوتیک خوراکی استفاده کند .

پس از باز کردن پانسمان از بیمار می خواهیم که به مدت 3 تا 4 هفته روزی 2 تا 3 بار پماد آنتی بیوتیک داخل چشم بگذارد .