



مرکز آموزشی درمانی شفا

عنوان سند:

نحوه استفاده از شامپو پرمترین

کد سند: NO-BK-412



تهیه کننده:

زهرا خادمی زاده

سوپروایزر کنترل عفونت

عوارض جانبی شامپو نیکستین پرمترین ادرسد:

هر دارو به موازات اثرات درمانی خود اثرات جانبی را نیز به همراه دارد که تمامی عوارض به یک باره در یک فرد ظاهر نمی شود . احساس سوزش ، گزش ، اریتم و راش ممکن است ظاهر شود .

مصرف در بارداری:

در صورت نیاز مبرم ، استفاده از دارو حداکثر دوبار در تمام طول آبستنی و شیر دهی مجاز می باشد .

مصرف در کودکان:

در کودکان کوچکتر از 2 ماه سن مصرف نگردد .

منبع : شرکت داروسازی گیلارانکو

نکات قابل توصیه هنگام استفاده از شامپو نیکستین پرمترین ادرصد :

1. قبل از مصرف فرآورده را به خوبی تکان دهید .
2. تمام لباسها ، ملحفه ها و حوله های بیمار باید با آب داغ شسته و یا با اسپری ویژه البسه درمین آغشته گردد .
3. تمامی افراد خانواده فرد مبتلا نیز همزمان باید درمان گردند .
4. برای جلوگیری از گسترش آلودگی، شانه و برس را نیز با شامپو پرمترین بشویید .
5. از تماس دارو با چشم و دهان خودداری گردد .
6. از مصرف شامپو پرمترین بطور معمولی و مرتب اجتناب شود .
7. این دارو برای استعمال خارجی است .
8. دور از دسترس اطفال نگهداری گردد .
9. از مصرف دارو روی زخم های باز، خراشیدگی و بریدگی ها اجتناب گردد .

شامپو نیکستین پرمترین ۱ درصد

دسته دارویی :

ضد شپش

موارد مصرف :

شامپو نیکستین پرمترین ۱ درصد حاوی پرمترین به عنوان شامپو برای درمان آلودگی ناشی از شپش سر انسانی بکار برده می شود .

مقدار و نحوه مصرف :

معمولاً مصرف یکبار از این شامپو برای بیماران مبتلا به شپش سر تقریباً در تمامی موارد نتیجه درمانی مثبت دارد . هنگام استفاده از این شامپو به هیچ وجه از درمان های سنتی مانند استفاده از سرکه و ... بدلیل احتمال کاهش اثر دارو استفاده نگردد . ضمناً مصرف این دارو در انسان کمترین حد سمیت را نسبت به سایر فرآورده های مشابه دارد .

نحوه مصرف شامپو نیکستین پرمترین ۱ درصد:

ابتدا باید موها را با یک شامپوی درمین (بدون نرم کننده و حالت دهنده) به خوبی بشویید و سپس موها را بخوبی آب کشیده و تا حدی که فقط آب موها گرفته شود ، خشک نمایید . آنگاه مقدار کافی از شامپو نیکستین (پرمترین) (برای موهای بلند شامپوی کامل ، برای موهای متوسط 3/4 شامپو و برای موهای کوتاه از نصف شامپو) روی موهای نم دار بدون استفاده از آب اضافی استفاده نمایید ، تمام موها و پوست سر به خوبی به شامپو آغشته شود و اجازه دهید 10 دقیقه در همان حالت باقی بماند سپس موها را شسته و به خوبی آب بکشید . تا 2 روز از شستن موها خودداری کنید . اگر پس از یک هفته شپش زنده در موی سر مشاهده شد ، درمان تکرار شود .

نحوه شانه کردن به هنگام استفاده از شامپو نیکستین پرمترین ۱ درصد:

موهای سر را به چند قسمت تقسیم نموده و هر قسمت را طبق روش زیر شانه نمایید . ابتدا موی سر را با شانه معمولی شانه کنید تا موها صاف و گره مو باز شود . سپس از شانه دندانه ریز موجود در بسته بندی به روش زیر برای جدا کردن تخم شپش و شپش های مرده استفاده کنید . نوک شانه دندانه ریز را به سمت خود گرفته و مقداری از مو را از کف سر به صورتی که شانه ابتدا چسبیده به کف سر باشد، به سمت انتهای مو شانه نمایید . بعد از هر بار شانه کردن با دستمال کاغذی شپش ها را از شانه جدا کنید و دستمال کاغذی را در کیسه پلاستیکی بریزید . موهای شانه شده را با یک کلیپس از قسمت های شانه نشده جدا نموده و قسمت های دیگر مو را به همین ترتیب تا شانه شدن تمامی موها ادامه دهید . سپس کلیپس ها را جدا نموده و مجدداً موها را با آب گرم شستشو دهید .