



عنوان سند: انحراف بینی یا

سپتوپلاستی

کد سند: NO-BK-87



تهیه کننده:

خانم دکتر عامی زاده

تنظیم کننده: فرحناز نریمسیا

سوپروایزر آموزش سلامت

مراقبت های پس از عمل:

- پس از عمل زیر سر بیمار باید بالا باشد و تا سه ساعت پس از عمل نباید چیزی بخورد.
- بیمار باید با دهان باز نفس بکشد.
- از خم کردن سر و یا عطسه زدن و سرفه کردن بپرهیزید.
- ۲ روز پس از عمل از بینی خارج می شوند.
- پس از ۷-۱۰ روز پس از عمل هم بخیه ها کشیده می شوند.
- بهتر است بیمار پس از عمل، رژیم غذایی نرم داشته باشد و پس از ۲ روز هم می تواند رژیم غذایی معمول داشته باشد.

منابع: کامینگز

جراحی انحراف بینی یا سپتوپلاستی

تیغه میانی بینی یا سپتوم در اثر ضربه و یا طی فرایند رشد از مسیر مستقیم خود منحرف شده و منجر به علایمی همچون تنگی نفس، خرخر شبانه، سردرد یا گرفتگی بینی می شود.

پزشک با جراحی، تیغه بینی را صاف کرده و درون بینی بیمار را بامش چرب (آغشته به پماد تتراسایکلین) پر می کند، سپس بینی بیمار پانسمان می شود.